




BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO No 7: MALARIA

Semana: No. 47
2 diciembre 2014

Editores: Dra. Lizbeth Cerezo / Licdo. Carlos Victoria/Licdo. Fernando Vizcaino



Casos actuales y acumulados de malaria confirmados según región de salud en Panamá 2014


| Región | Casos | | Tasa |
|-------------------|----------|------------|-------------|
| | Actuales | Acumulados | |
| Ngobe Bugle | | 39 | 20.2 |
| Darién | | 188 | 285.0 |
| P. Este | 5 | 396 | 303.7 |
| Guna Yala | | 133 | 320.1 |
| Importados | | 9 | |
| Total País | 5 | 765 | 19.4 |

Se han examinado a nivel nacional 69798 muestras resultando positivas 765, de los cuales 9 son importados; de estos 7 son de *P. falciparum*.



En esta semana se registran 5 casos, se actualizan casos de semanas anteriores.

En las 14 regiones de salud se captan, notifican y diagnostican casos.

Fuente: departamento de control de vectores/sección estadística




Para esta semana en el 2013 teníamos 592 casos, por lo que este año tenemos 173 mas acumulados que el año pasado.



Fuente: Departamento de Control de Vectores/Sección de Estadística


Fuente: departamento de control de vectores/INMISA Panamá

AREAS DONDE PERSISTE TRANSMISION DE MALARIA
REPÚBLICA DE PANAMÁ, AÑO 2014.



Anopheles albimanus

Casos de paludismo según plasmodium en Panamá 2001-2014 sem 47



Fuente: departamento de control de vectores/MINSA Panamá

Desde el año 2010 no se registra casos autóctonos en el país de *P. falciparum*; los siete casos que se registran este año son de África (4) y Colombia (3).

Medidas de Prevención y pre-eliminación

- Búsqueda activa de casos
- Abordaje integral de los casos sospechosos en la investigación de campo.
- Orientación a la comunidad sobre eliminación de criaderos.
- Aplicación de larvicidas en criaderos.
- Nebulización intra y extra domiciliar.
- Seguimiento de casos
- Tratamiento estrictamente supervisado
- Primer grupo de técnicos de control de vectores capacitado en "Reorientación de la malaria con miras a la preeliminación-eliminación" en todas las regiones de salud.

Limitantes

- Barreras interculturales en las comarcas indígenas
- Dificultad en la adherencia al medicamento

Referencias bibliográficas

1. www.paho.org/paludismo