

**Tabla No.2**

**ESQUEMA PARA EL TRATAMIENTO RADICAL DE INFECCIONES  
POR P. vivax**

**1999**

GRUPO DE EDAD	1er Día		2do Día		3er Día		Del 4° al 14° Día
	Cloro- quina	Prima- quina	Cloro- quina	Prima- quina	Cloro- quina	Prima- quina	Primaquina sola
Menores de 6 meses	½	---	¼	---	¼	---	---
De 6 a 11 meses	½	½ Inf	½	½ Inf	½	½ Inf	½ Inf
De 1 a 2 años	1	½ Inf	½	½ Inf	½	½ Inf	½ Inf
De 3 a 6 años	1	1 Inf	1	1 Inf	1	1 Inf	1 Inf
De 7 a 11 años	2	2 Inf	1 ½	2 Inf	1 ½	2 Inf	2 Inf
De 12 a 14 años	3	1Ad	2	1 Ad	2	1 Ad	1 Ad
De 15 años y más	4	1 Ad	3	1 Ad	3	1 Ad	1 Ad

Observaciones:

- 1) Ninguna dosis debe ser administrada antes de transcurrir las 24 horas de la dosis anterior.
- 2) No se suministre primaquina a niños menores de 6 meses.

Comprimido Cloroquina	150 mg base
Comprimido Primaquina	15 mg base
Comprimido Primaquina Infantil	5 mg base

**Tabla No.2 A**

**ESQUEMA DE TRATAMIENTO DE CURA RADICAL DE CINCO DIAS  
CON CLOROQUINA Y PRIMAQUINA ADULTO**

***P. vivax*  
1999**

Grupo de Edad	Cloroquina 150 mg				Primaquina 15 mg					
	1er. Día		2do. Día		3er. Día		4to. Día		5to. Día	
	Cloroquina	Primaquina	Cloroquina	Primaquina	Cloroquina	Primaquina	Cloroquina	Primaquina	Cloroquina	Primaquina
Menores de 6 meses Solo Cloroquina	¼	---	¼	---	¼	---	---	---	---	---
De 6 a 11 meses	½	½	¼	¼	¼	¼	¼	¼	¼	¼
De 1 años a 2 años	½	½	½	½	½	½	¼	¼	¼	¼
De 3 años a 6 años	1	1	½	½	½	½	½	½	½	½
De 7 años a 11 años	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
De 12 años a 14 años	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Mayores de 15 años	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1

Observación : No usar Primaquina Infantil

**Tabla No.2 B**

**ESQUEMA DE TRATAMIENTO DE CURA RADICAL DE CINCO DIAS  
CLOROPRIMAQUINA  
P. vivax  
1999**

GRUPO DE EDAD	CLOROPRIMAQUINA										CLOROQUINA		
	1er. DIA		2do. DIA		3er. DIA		4to. DIA		5to. DIA		DIAS		
	AD	INF	AD	INF	AD	INF	AD	INF	AD	INF	1°.	2°.	3°.
Menores de 6 meses Solo Cloroquina											1/4	1/4	1/4
De 6 a 11 meses		1		½		½		½		½			
De 1 año a 2 años		1		1		1		½		½			
De 3 años a 6 años	1			1		1		1		1			
De 7 años 11 años	1		1		1		1		1				
De 12 años a 14 años	2		2		1		1		1				
Mayores de 15 años	3		2		2		2		1				

**TABLA 3**

**ESQUEMA PARA EL TRATAMIENTO RADICAL DE INFECCIONES  
POR *P. falciparum*  
( días)**

**1999**

<b>DROGA, DOSIS E INTERVALOS GRUPOS DE EDAD</b>	<b>1°. DIA</b>			<b>2°. DIA</b>	<b>3°. DIA</b>
	<b>CLOROQUINA</b>	<b>PRIMAQUINA</b>		<b>CLOROQUINA</b>	<b>CLOROQUINA</b>
		<b>ADULTO</b>	<b>INFANTIL</b>		
<i>Menores de 6 meses</i>	<i>¼ past.</i>	---	---	<i>¼ past.</i>	<i>¼ past.</i>
<i>De 6 a 11 meses</i>	<i>½ past.</i>	---	<i>1 ½</i>	<i>½ past.</i>	<i>½ past.</i>
<i>De 1 a 2 años</i>	<i>1 past.</i>	---	<i>2</i>	<i>½ past.</i>	<i>½ past.</i>
<i>De 3 a 6 años</i>	<i>1 past.</i>	<i>1</i>	---	<i>1 past.</i>	<i>1 past.</i>
<i>De 7 a 11 años</i>	<i>2 past.</i>	<i>2</i>	---	<i>1 ½ past.</i>	<i>1 ½ past.</i>
<i>De 12 a 14 años</i>	<i>3 past.</i>	<i>3</i>	---	<i>2 past.</i>	<i>2 past.</i>
<i>De 15 o mas años</i>	<i>4 past.</i>	<i>3</i>	---	<i>3 past.</i>	<i>3 past.</i>

*Para los niños de menos de 6 años, procúrese dar la pastilla machacada y disuelta en agua azucarada.*

*Comprimido de Cloroquina                      150 mg. bases*  
*Comprimido de Primaquina                    15 mg. base*  
*Comprimido de Primaquina Infantil        5 mg. base*

*Tabla No.4*

**TRATAMIENTO COLECTIVO- DOSIS UNICA**

1999

<i>EDAD</i>	<i>P A S T I L L A S</i>		
	<i>Cloroquina</i>	<i>Cloro-primaquina adultos</i>	<i>Cloro-primaquina infantil</i>
<i>Menores de 6 meses</i>	$\frac{1}{4}$	---	---
<i>De 6 a 11 meses</i>	---	---	<i>1</i>
<i>De 1 a 2 años</i>	---	<i>1</i>	---
<i>De 3 a 4 años</i>	---	<i>1 ½</i>	---
<i>De 7 a 12 años</i>	---	<i>2</i>	---
<i>De 13 años y más</i>	---	<i>3</i>	---

- *A los niños menores, darles las pastillas disueltas en agua.*

*Pastilla de Cloroquina*

*150 mg base*

*Pastilla de Cloroprimaquina Adulto*

*150 mg cloroquina y 15 mg primaquina*

*Pastilla de Cloroprimaquina infantil*

*75 mg cloroquina y 15 mg primaquina*

**TABLA 5**

**ESQUEMA DE TRATAMIENTO A P.falciparum  
RESISTENTE A CLOROQUINA  
1999**

<b>GRUPOS DE EDAD</b>	<b>PRIMER DIA</b>		<b>SEGUNDO DIA</b>		
	<b>FANASIL</b>	<b>PIRIMETAMINA</b>	<b>FANASIL</b>	<b>PRIMAQUINA</b>	
				<b>ADULTO</b>	<b>INFANTIL</b>
<b>6 a 11 meses</b>	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		$1 \frac{1}{2}$
<b>1 a 2 años</b>	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		<b>2</b>
<b>3 a 6 años</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	$\frac{1}{2}$	<b>1</b>	
<b>7 a 11 años</b>	$1 \frac{1}{2}$	$1 \frac{1}{2}$	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>12 a 14 años</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	
<b>15 y más años</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	$1 \frac{1}{2}$	<b>3</b>	

*Administrar las pastillas con suficiente agua.*

*Composición de cada pastilla:*

*Fanasil                    500 mg*  
*Primaquina adulto    15 mg*  
*Primaquina infantil    5 mg*

*Tabla No.6*

**ESQUMA DE TRATAMIENTO DE INFECCIONES A *P. vivax*  
TRATAMIENTO COLECTIVO**

1999

<b>GRUPOS DE EDAD</b>	<b>PRIMER DIA</b>		<b>SEGUNDO DIA</b>		<b>TERCER DIA</b>	
	<b>Cloro- prima</b>	<b>Pirime- temina</b>	<b>Cloro- prima</b>	<b>Pirime- tamina</b>	<b>Cloro- prima</b>	<b>Pirime- tamina</b>
<b>3 a 5 meses</b>	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	---	---	---
<b>6 a 11 meses</b>	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	---	$\frac{1}{4}$	---
<b>1 a 2 años</b>	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	---
<b>3 a 4 años</b>	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	---
<b>5 a 7 años</b>	<b>1</b>	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	----
<b>8 a 10 años</b>	<b>1</b>	$\frac{1}{2}$	<b>1</b>	$\frac{1}{2}$	<b>1</b>	---
<b>11 a 14 años</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	$\frac{1}{2}$	<b>1</b>	---
<b>15 y mas años</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	---

*Una pastilla de Cloroprime equivale a :*

*150 mg de Cloroquina  
15 mg de Primaquina*

*Pirimetamina = 25 mg*

**Tabla No. 9**

**TRATAMIENTO RADICAL CON FANSIDAR EN LAS INFECCIONES A *P. falciparum* RESISTENTES A DOBLE DOSIS DE CLOROQUINA**

		<i>F A N S I D A R</i>			
GRUPO EDAD	DIAS DOSIS	D I A S			PRIMAQUINA
		PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
	<i>De 6 a 11 meses</i>	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
	<i>De 1 a 2 años</i>	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
	<i>De 3 a 6 años</i>	<i>1</i>	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	<i>1</i>
	<i>De 7 a 11 años</i>	$1 \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$1 \frac{1}{2}$
	<i>De 12 a 14 años</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	$\frac{1}{2}$	<i>2</i>
	<i>De 15 y más años</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>3</i>

- 1) *A los menores de 6 meses no se les dará tratamiento*
- 2) *No administren tratamiento a las mujeres durante el embarazo*
- 3) *A los niños menores de 6 años, darles las pastillas diluidas en agua azucarada.*
- 4) *Composición de cada pastilla*

*FANASIL= 500 mg*  
*PIRIMETAMINA= 25 mg*  
*PRIMAQUINA= 15 mg*



*Tabla No. 9-A*

**TRATAMIENTO RADICAL CON FANSIDAR  
EN LAS INFECCIONES A *P. falciparum*  
RESISTENTE A DOBLE DOSIS DE CLOROQUINA**

1999

<i>GRUPO EDAD</i>	<i>PRIMERO</i>	<i>SEGUNDO</i>		<i>TERCERO</i>	<i>CUARTO</i>		
	<i>FANSIDAR</i>	<i>FANSIDAR</i>	<i>PRIMAQUINA</i>		<i>FANSIDAR</i>	<i>PRIMAQUINA</i>	
			<i>Adulto</i>	<i>Inf</i>		<i>Adulto</i>	<i>Inf</i>
<i>De 6 a 11 meses</i>	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$		$1 \frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$		$1 \frac{1}{2}$
<i>De 1 a 2 años</i>	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		2	$\frac{1}{4}$		2
<i>De 3 a 6 años</i>	1	$\frac{1}{2}$	1		$\frac{1}{2}$	1	
<i>De 7 a 11 años</i>	$1 \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	2		$\frac{1}{2}$	2	
<i>De 12 a 14 años</i>	2	1	3		$\frac{1}{2}$	3	
<i>De 15 a más años</i>	3	1	3		1	3	

1. *A los menores de 6 meses aplicar tabla 3 por tres días sólo cloroquina.*
2. *No Administrar a mujeres embarazadas, a ellas aplicar tabla 3 por tres días sólo cloroquina.*
3. *A niños menores de 6 años darles las pastillas diluidas en agua.*
4. *Composición del Fansidar: Fanasil 500mg, pirimetamina 25 mg*
5. *Primaquina adulta= 15mg,*
6. *Primaquina infantil= 5 mg*

**Tabla No.11**

**ESQUEMA ESPECIAL DE TRATAMIENTO DE INFECCIONES  
A *P. falciparum* RESISTENTES A CLOROQUINA-PIRIMETAMINA-SULFADOXINA**

1999

GRUPOS DE EDAD	1er DIA		2do. DIA		3er DIA	
	Amodia- quina	Tetraci- clina	Amodia- quina	Tetra- ciclina	Amodia- quina	Tetraci- clina
De 6 meses	½ t.	250 mg	½ t.	250 mg	½ t.	250 mg
De 6 a 11 meses	½ t.	250 mg	½ t.	250 mg	½ t.	250 mg
De 1 a 2 años	1 t.	375 mg	1 t.	375 mg	1 t.	375 mg
De 3 a 6 años	1 t.	500 mg	1 t.	500 mg	1 t.	500 mg
De 7 a 11 años	2 t.	750 mg	2 t.	750 mg	2 t.	750 mg
De 12 a 14 años	3 t.	1500 mg	2 t.	1500 mg	2 t.	1500 mg
De 15 y más años	4 t.	2500 mg	3 t.	2500 mg	3 t.	2500 mg

**NOTA:** Tableta de Amodiaquina 150 mg  
Cápsulas de Tetraciclina 250 mg.

**Tetraciclina:** Se administrar por médicos únicamente a la dosis de 40 por kilo de peso por día, fraccionada en tomas cada 4 horas.. Las dosis del cuadro son aproximadamente a la mediana del peso del grupo correspondiente.

**OBSERVACIONES:**

1. Administrar los medicamentos después de haber comido o darlos con abundante agua.
2. Para los niños menores de 5 años los medicamentos deberán administrarse preferiblemente disueltos en agua azucarada.