



**MINISTERIO DE SALUD**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DE SALUD POBLACIONAL**



**SERIE CRONOLÓGICA DE INDICADORES DEL NIVEL I / ODS 3**

**JUNIO 2019**

### SERIE CRONOLÓGICA DE INDICADORES DEL OJETIVO 3

#### Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

META	INDICADOR	SERIE CRONOLOGICA									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.1. De aquí al año 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 muertes por 100,00 nacidos vivos.	3.1.1. Razón de mortalidad materna x 100,000	60.3	80.5	64.9	55.6	58.5	52.7	49.2	35.4		
	3.1.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado	92.4	93.5	94.3	92.8	93.9	95.0	94.6	94.2		
3.2. Para el año 2030, finalizar las muertes evitables en niños menores de cinco años.	3.2.1. Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años	17.8	16.7	18.3	19.1	17.4	16.2	17.8	17.4		
3.2.a. Para el año 2030, finalizar las muertes evitables en los menores de 1 año.	3.2.1.a. Tasa de mortalidad infantil	13.4	13.2	14.3	15.0	13.8	12.3	13.9	14.0		
3.2.3. Para el año 2030, finalizar las muertes evitables en menores de 28 días de nacidos.	3.2.. Tasa de mortalidad neonatal	6.8	7.3	8.3	8.5	7.9	7.2	7.7	7.7		
3.2.3.a. Para el año 2030, finalizar las muertes evitables entre las 28 semanas y los siete primeros días de vida.	3.2.3.a Tasa de mortalidad perinatal	10.6	10.8	11.8	11.5	11.6	11.2	10.4	13.1		

**SERIE CRONOLÓGICA DE INDICADORES DEL OBJETIVO 3**

**Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades**

META	INDICADOR	SERIE CRONOLOGICA									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.a. Para el año 2030, finalizar la epidemia de SIDA, tuberculosis, malaria y enfermedades desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.	3.3.1 Número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1.000 habitantes no infectados, desglosado por sexo, grupo de edad, y sectores clave de la población: (trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres y población trans)	20.7	19.8	20.4	22.7	22.1	26.9 0.26 x 1000. Hombre: 0.40 Mujer 0.15 ( x 1000)  2016 Módulo nuevo sobre etnia, información sería dada en 2019	24.1	28.6		

**SERIE CRONOLÓGICA DE INDICADORES DEL OBJETIVO 3**

**Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades**

META	INDICADOR	SERIE CRONOLOGICA									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.b. Para el año 2030, finalizar la epidemia de tuberculosis	3.3.2 Incidencia de la tuberculosis por cada 1.000 habitantes	44.2	43.4	44.7	35.0	38.6	42.2	39.3	41.1		
3.3.c. Para el año 2030, finalizar la epidemia malaria	3.3.3. Incidencia de la malaria por cada 1.000 habitantes	0.11	0.09	0.23	0.18	0.22	0.14	0.20	0.17		
	Incidencia por población malárica (x 100000)	12.3	10.3	24.6	18.9	23.1	14.6	20.8	17.9		
3.3.d. Para el año 2030, finalizar la epidemia de hepatitis	3.3.4. Incidencia de hepatitis B por cada 100.000 habitantes	2.8	3.5	5.9	4.9	5.5	4.7 Hombres 6.2, Mujeres: 3.2.	3.2	2.2		



**SERIE CRONOLÓGICA DE INDICADORES DEL OBJETIVO 3**

**Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades**

META	INDICADOR	SERIE CRONOLÓGICA									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.4. Para el año 2030, reducir un tercio de la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, a través de la prevención, tratamiento y el fomento de la salud mental y el bienestar.	3.4.1.a . Tasa de mortalidad prematura atribuida a las enfermedades Cardiovasculares	32.0	46.4	43.1	42.3	41.6	<b>40.5</b> Hombres: 55.9, Mujeres: 25.7	39.5	40.2		
	3.4.1.b Tasa de mortalidad prematura atribuida a las enfermedades Cáncer	36.76	36.45	40.72	35.95	36.57	36.00 Hombres: 37.8 Mujeres: 37.44	35.11	35.43		
	.4.1.b Tasa de mortalidad prematura atribuida a Cáncer de Mama Femenina	7.71	7.53	7.58	7.70	7.22	6.83	7.80	7.49		
	.4.1.b Tasa de mortalidad prematura atribuida a Cáncer Cérvico Uterino	5.53	5.84	5.09	4.49	5.69	5.84	5.00	4.97		
	4.1.b Tasa de mortalidad prematura atribuida a Cáncer de Próstata	4.61	3.19	0.17	3.39	2.82	1.73	2.61	3.35		

\*Para tumores malignos se utiliza la población estandarizada de Segi - Doll y la población estandarizada con la ponderación de OPS.

**SERIE CRONOLÓGICA DE INDICADORES DEL OBJETIVO 3**

**Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades**

META	INDICADOR	SERIE CRONOLÓGICA									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.4. Para el año 2030, reducir un tercio de la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, a través de la prevención, tratamiento y el fomento de la salud mental y el bienestar.	3.4.1.c. Tasa de mortalidad prematura atribuida a la diabetes	30.8	12.4	13.6	13.0	14.8	15.5	12.4	13.0		
	3.4.1.d. Tasa de mortalidad prematura atribuida a las enfermedades Respiratorias	6.8	6.1	7.0	7.8	6.1	5.2 Hombres: 5.8 Mujer: 5.8	5.7	5.8		

**SERIE CRONOLÓGICA DE INDICADORES DEL OBJETIVO 3**

**Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades**

META	INDICADOR	SERIE CRONOLÓGICA									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.4. Para el año 2030, reducir un tercio de la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, a través de la prevención, tratamiento y el fomento de la salud mental y el bienestar.	3.4.1.e. Tasa de suicidio	4.2	3.9	3.6	3.4	3.4	3.8	3.0	3.0		
	3.4.1.f. Tasa de intento de suicidio	9.3	12.7	12.1	20.2	10.7	6.04	4.5	8.1		
	3.4.1g. Porcentaje de consulta por depresión	9.9	14.7	13.8	13.8	14.6	11.8	12.1	12.8		



**SERIE CRONOLÓGICA DE INDICADORES DEL OBJETIVO 3**

**Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades**

META	INDICADOR	SERIE CRONOLÓGICA									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.5. Fortalecer la prevención y el tratamiento de abuso de sustancias, incluyendo el abuso de narcóticos y el uso nocivo del alcohol.	3.5.2. Prevalencia anual del Consumo nocivo de alcohol, de población de 12 años y más.  (Porcentaje respecto a la población entre 12 y 65 años.)						*Total 10.98  Hombres: 19.27  Mujeres: 3.99				
3.6. Para el año 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causados por accidentes de tráfico en el mundo.	3.6. 1. Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidente de tránsito.	12.5	12.6	12.9	11.7	12.1	11.9; Hombre: 19.3; Mujeres: 4.6	11.7	11.4		

\* Segunda Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo de Drogas 2015

**SERIE CRONOLÓGICA DE INDICADORES DEL OBJETIVO 3**

**Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades**

META	INDICADOR	SERIE CRONOLÓGICA									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.7. De aquí al año 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo los servicios de planificación familiar, información educación y la integración del componente de salud sexual y reproductiva en las estrategias y programas nacionales.	3.7.1 Proporción de mujeres en edad de procrear (de 15 a 49 años de edad) que practican la planificación familiar con métodos (de efectividad comprobada) modernos.				34.7						
	3.7.2.a. Tasa de fecundidad de los adolescentes (de 10 a 14 años) por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad.	3.6	3.8	3.3	3.8	3.8	3.4	2.9	2.9		
	3.7.2. b. Tasa de fecundidad de los adolescentes (de 15 a 19 años) por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad.	82.2	88.8	90.2	86.9	85.9	84.0	78.8	75.3		

**SERIE CRONOLÓGICA DE INDICADORES DEL OBJETIVO 3**

**Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades**

META	INDICADOR	SERIE CRONOLÓGICA									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda.	Prevalencia de consumo actual de tabaco entre personas de 15 o más años de edad.						*6.1% para la población en general Hombres: 9.4%, Mujeres: 2.8%		7.8		

- Encuesta Mundial de Tabaco en Adultos/ Ministerio de Salud. Año: 2013.

**SERIE CRONOLÓGICA DE INDICADORES DEL OBJETIVO 3**

**Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades**

META	INDICADOR	SERIE CRONOLÓGICA									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.c Aumentar considerablemente la financiación de la salud y la contratación, el perfeccionamiento, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en Desarrollo	3.c.1. Densidad y distribución de los trabajadores sanitarios.	64.0	67.25	69.76	67.86	70.62	70.96	73.48	73.11		

<b>Línea Base</b>	<b>2015</b>
Médicos	15.79
Odontólogos	3.06
Enfermeras	13.45
Técnicos de Enfermería	12.75
Asistentes de Enfermería	3.21
Laboratoristas	3.3
Asistente de Laboratorio	1.49
Técnicos (as) radiólogos (as)	1.8
Farmacéuticos	1.95
Asistentes de Farmacia	2.32
Técnicos dentales	1.67
Trabajadores sociales	1.03
Psicólogos	1
Optometristas	0.09
Terapistas físicos	1,07
Nutricionistas	0.64
Dietistas	0.05
Técnicos (as) de registros médicos	3.57
Técnicos de electrocardiograma	0.44
Inspectores (as) de saneamiento	0.63
Promotores de la salud	0.47
Camilleros (as)	0.83

<b>Línea Base</b>	<b>2017</b>
Médicos	15.89
Odontólogos	14.47
Enfermeras	3.04
Técnicos de Enfermería	13.47
Asistentes de Enfermería	2.99
Laboratoristas	2.87
Asistente de Laboratorio	1.44
Técnicos (as) radiólogos (as)	1.57
Farmacéuticos	2.09
Asistentes de Farmacia	2.15
Técnicos dentales	1.82
Trabajadores sociales	0.89
Psicólogos	0.79
Optometristas	0.10
Terapistas físicos	0.81
Nutricionistas	0.55
Dietistas	0.08
Técnicos (as) de registros médicos	3.77
Técnicos de electrocardiograma	0.49
Inspectores (as) de saneamiento	0.56
Promotores de la salud	0.39
Camilleros (as)	1.00