


República de Panamá
Ministerio de Salud
Dirección General de Salud Pública
Departamento de Epidemiología
Informe de Virus Respiratorios
2026
SE 34

Elaborado por: Dra. Yadira de Moltó / Dra. Catherine Castillo
Revisado: Dr. Pablo González - Jefe del Departamento Nacional de Epidemiología

A través de la vigilancia del síndrome gripal (ETI), las neumonías y bronconeumonías, y la bronquiolitis, se monitorea clínicamente el comportamiento de los virus respiratorios circulantes en el país.

Para la semana epidemiológica 34 de 2026, la tasa de incidencia del síndrome gripal se calculó en 16.8 casos por 100,000 habitantes, situándose por debajo del umbral estacional. En el caso de las neumonías y bronconeumonías, la tasa de incidencia correspondiente a la misma semana fue de 10.7 casos por 100,000 habitantes, manteniéndose sobre el umbral estacional pero bajo la curva epidémica.

Síndrome Gripal (ETI) : Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana y año.
Período 2010 -2025. República de Panamá. 2026/p




*: Tasa por 100 000 habitantes

/p SE 34

Fuente: Departamento de Epidemiología

Neumonía y Bronconeumonía: Tasa* de incidencia, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año.
Período 2009 -2025. República de Panamá. 2026/p




*: Tasa por 100 000 habitantes

/p SE 34

Fuente: Departamento de Epidemiología

Por su parte, la bronquiolitis presentó una tasa de incidencia de 15.6 casos por 100,000 habitantes, esta tasa es disminuye con respecto a la semana anterior. No obstante, este evento se ubica sobre el umbral estacional y de la curva epidémica.

Bronquiolitis: Tasa* de incidencia, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año.
Período 2009 -2025. República de Panamá. 2026/p



*: Tasa por 100 000 habitantes

/p SE 34

Fuente: Departamento de Epidemiología


Informe de COVID-19
SE 34

Para la semana epidemiológica 34 de 2026 se notificaron 14 casos confirmados de COVID-19, acumulándose 950 casos en lo que va del año. La positividad disminuye a 2.7% en comparación con la semana anterior. No se notifican defunciones para la SE 34 por lo que el acumulado anual de defunciones por COVID-19 es de 11.

DATOS SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 33 (16 al 22 de Agosto 2026)	
Nuevos casos confirmados	14
Hospitalizados	8
Sala	8
UCI	0
Defunciones	0
Pruebas de laboratorio realizadas	527
Porcentaje de positividad	2.7%

/p SE 34

Fuente: Departamento de Epidemiología



/p SE 34

Fuente: Departamento de Epidemiología


Defunciones por COVID-19

En cuanto a las defunciones por SARS-CoV-2, el 36.4% eran adultos mayores de 80 años y 36.4% menores de 20 años; y en cuanto al sexo y las mujeres representaban el 72.7%. El 100% de las defunciones no contaba con vacunación contra SARS-CoV-2 actualizada y 50% tenía 03 dosis cuya última vacunación fue en 2022. En cuanto a factores de riesgo el 55% presentaba edad de 60 y mas, comorbilidades metabólicas, cardiovasculares y renales.

Desde el punto de vista geográfico, las defunciones se concentraron principalmente en las regiones de San Miguelito y Comarca Ngöbe Buglé.

Tasa de mortalidad por COVID-19 por distrito en la República de Panamá

Agrupación por semana epidemiológica cada 5 semanas - 2026 / hasta SE 33



Fuente: Departamento de Epidemiología


Informe de Influenza
Reporte Semanal

SE 34 2026

Defunciones por Influenza:

En la semana epidemiológica 34 de 2026 no se notifican defunciones por influenza. El acumulado anual es de 63 defunciones.

Defunciones por influenza: Tasa* de mortalidad, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana y año. Período 2015 - 2019, 2022-2025. República de Panamá. 2026/p




/p SE 34

Fuente: Departamento de Epidemiología

Defunciones por influenza según características epidemiológicas

Defunciones por influenza según sexo y grupo de edad, en la República de Panamá, 2026 /p



/p SE 34

Fuente: Departamento de Epidemiología

Del total de 63 defunciones por influenza registradas en el año, el 57.1% correspondió a hombres.


La mayor proporción de defunciones se concentró en el grupo de 65 años y más (61.9%), seguido por los menores de 1 año y el grupo de edad de 60-64 (9.5%).

En cuanto a antecedentes, el 98.4% de las defunciones no contaba con vacunación contra influenza en la temporada actual y 82.5% tampoco estaba vacunado contra la temporada 2025, mientras que el 82.5 % presentaba factores de riesgo, principalmente relacionados con edad avanzada y comorbilidades metabólicas, cardiovasculares y renales.

Respecto al agente identificado, la mayoría de las defunciones se asociaron a influenza A (72.1%), incluyendo subtipos H1N1pdm09 y H3N2, mientras que una menor proporción correspondió a influenza B.

Tasa de mortalidad por Influenza por distrito en la República de Panamá

Agrupación por semana epidemiológica cada 5 semanas - 2026/pSE 33




Fuente: Departamento de Epidemiología

Informe de Virus Sincitial Respiratorio
Reporte Semanal
SE 34 2026

Defunciones por Virus Sincitial:

En la semana epidemiológica 34 de 2026 no se notifica defunciones por vsr. El acumulado anual es de 19 defunciones. En cuanto al comportamiento temporal, 15 de las 19 defunciones (78.9%) se registraron entre las semanas epidemiológicas 23 y 33. La mayor frecuencia se observó en la SE 27, con tres defunciones. Actualmente, la mortalidad se ubica por encima del umbral de alerta.


Defunciones por Virus Sincitial Respiratorio: Tasa* de mortalidad, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana y año. Período 2015 -2025. República de Panamá. 2026/p



SE 34

Fuente: Departamento de Epidemiología

Defunciones por Virus Sincitial respiratorio según sexo y grupo de edad, en la República de Panamá, 2026 /p



Del total acumulado, 17 defunciones (89.5 %) correspondieron a menores de 5 años y dos (10.5%) a personas de 65 años o más. Según el sexo, 13 defunciones (68.4 %) correspondieron al sexo masculino y 6 (31.6 %) al femenino.

La mediana de edad fue de aproximadamente 11 meses, con un rango entre 1 mes y 85 años.


Entre los menores de 5 años, 12 defunciones (63.2 %) correspondieron al sexo masculino y 5 (26.3 %) al femenino.

SE 34

Fuente: Departamento de Epidemiología

Tasa de mortalidad por VRS por distrito en la República de Panamá

Bloques de cinco semanas epidemiológicas, 2026/pSE 33



Distribución territorial: La comarca Ngäbe-Buglé concentró la mayor cantidad de defunciones, con seis casos (31,6 %), seguida de Bocas del Toro, con cuatro (21,1 %); Chiriquí, con tres (15,8 %); y Panamá Oeste, con dos (10,5 %). Coclé, Panamá Metro, Panamá Norte y San Miguelito registraron una defunción cada una (5,3 %).

Tasa de mortalidad por 100,000 habitantes
Sin defunciones Baja (>0 y <1) Media (1 a <3) Alta (>=3)

Vigilancia laboratorial de Virus respiratorios


SE 34 2026

En la semana epidemiológica 34 de 2026 se identificó circulación de diversos virus respiratorios, incluyendo VSR, influenza, rinovirus, parainfluenza y metapneumovirus. La influenza con una positividad del 11.5% se ubica sobre el umbral estacional y la curva epidémica.

El VSR presentó una positividad de 44.3%, siendo el virus detectado con mayor frecuencia, situándose por encima de la curva epidémica, pero bajo el umbral de alerta.


Por su parte, la positividad de SARS-CoV-2 fue de 013, manteniéndose por debajo del umbral estacional y de la curva epidémica. El Metaneumovirus presenta una positividad de % sobre el umbral de alerta.

Número de muestras positivas por virus respiratorios, vigilancia centinela de la República de Panamá, 2026/p



Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet


Porcentaje de positividad de Influenza, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año. Periodo 2015 - 2025. República de Panamá. 2026/p.



/p SE 34

Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet

Porcentaje de positividad de Virus Sincital Respiratorio, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año. Periodo 2013-2019 y 2024. República de Panamá. 2026/p.



/p SE 34

Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet


Porcentaje de positividad de SARS-CoV-2, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año. Periodo 2020-2025. República de Panamá. 2026/p.



45


Periodo 2012-2019 y 2021-2025. República de Panamá. 2026/p. -





/p SE 34

Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet



/p SE 34

Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet

Muestras positivas a virus respiratorios en sitios centinelas de Panamá, según semana epidemiológica. 2026p

Año	SE	Positivo Influenza A				Positivo Influenza B			Positivo VRS			Positivo SARS-CoV-2	Positivo otros virus respiratorios*							
		A(H1N1)pdm09	A no subtipificado	A no subtipificable	A(H3N2)	B Victoria	B Yamagata	B linaje no determinado	VRS no tipificado	VRS A	VRS B		SARS-CoV-2	Parainfluenza	Adenovirus	Metapneumovirus	Rinovirus	Coronavirus	Bocavirus	Otros
YEAR	EW	FLU_H1N1	FLU_A NOSU	FLU_ANO SA	FLU_AH3	FLU_BVIC	FLU_BYAM	FLU_BNDT	RSV_NP	RSV_A	RSV_B	SC2	ORV_P ARAINF	ORV_ADE NO	ORV_ME TAPNEU	ORV_RHI NO	ORV_CO RONA	ORV_BO CA	ORV_OTHER	
2026	1	51	2	0	28	1	0	0	32	12	13	11	0	2	5	21	0	9	0	
2026	2	25	11	0	28	1	0	0	33	22	15	8	2	0	3	26	2	2	0	
2026	3	16	13	0	12	1	0	0	17	12	5	5	6	0	5	26	1	1	0	
2026	4	10	10	0	18	0	0	0	24	14	1	4	0	5	1	22	0	5	0	
2026	5	3	7	0	4	0	0	0	16	13	4	1	5	5	5	31	0	1	1	
2026	6	1	8	0	12	0	0	0	5	0	1	0	5	1	2	15	1	1	0	
2026	7	4	2	0	10	0	0	0	1	5	2	2	7	1	1	8	3	1	1	
2026	8	11	3	0	19	0	0	1	0	4	1	6	2	1	1	13	1	0	0	
2026	9	5	2	0	33	0	0	2	2	1	1	3	4	0	1	22	0	1	0	
2026	10	6	5	0	16	0	0	2	2	3	0	5	1	1	1	21	0	2	0	
2026	11	2	7	0	16	0	0	2	6	2	0	6	2	5	0	25	3	0	2	
2026	12	3	1	0	22	0	0	0	4	1	2	9	2	4	4	26	3	0	0	
2026	13	0	2	0	24	0	0	1	3	2	1	8	5	0	0	20	1	1	0	
2026	14	0	1	0	22	0	0	2	4	5	0	5	4	1	0	22	2	2	1	
2026	15	0	0	0	8	0	0	0	2	2	3	1	6	4	0	22	0	0	0	
2026	16	0	4	0	15	1	0	1	9	5	0	3	8	3	0	26	1	1	1	
2026	17	0	1	0	19	1	0	0	10	7	0	3	2	5	0	13	2	1	0	
2026	18	0	3	0	28	1	0	0	12	13	2	6	4	2	1	22	2	5	0	
2026	19	2	9	0	34	0	0	0	13	10	3	1	8	2	1	25	1	0	1	
2026	20	0	2	0	36	1	0	0	15	7	9	5	13	4	2	23	3	0	1	
2026	21	0	2	0	48	3	0	0	8	15	7	4	25	2	0	24	0	1	2	
2026	22	0	5	0	32	0	0	0	7	13	3	10	12	2	0	19	0	2	1	
2026	23	2	1	0	20	1	0	0	6	9	2	8	1	4	3	5	2	1	0	
2026	24	1	1	0	18	0	0	0	13	13	4	5	4	4	2	8	3	1	0	
2026	25	2	6	0	23	2	0	0	23	20	7	1	5	3	0	16	2	0	0	
2026	26	1	5	0	48	2	0	0	18	19	10	12	8	3	1	15	2	0	0	
2026	27	0	4	0	26	2	0	0	23	24	7	4	7	2	2	15	0	0	1	
2026	28	7	1	0	15	5	0	0	51	25	7	4	3	4	6	30	3	0	0	
2026	29	6	2	0	17	5	0	0	46	34	12	6	5	2	7	30	4	1	0	
2026	30	1	5	0	14	2	0	0	44	36	9	12	3	3	10	15	2	0	0	
2026	31	0	7	0	16	6	0	0	67	36	5	7	4	8	14	21	4	0	0	
2026	32	1	4	0	5	2	0	1	14	33	7	7	3	1	7	11	1	0	0	
2026	33	1	0	0	6	4	0	0	8	35	11	6	1	0	3	7	0	0	0	
2026	34	0	0	0	1	6	0	0	0	21	6	0	0	1	4	8	0	0	0	
2026	35																			
2026	36																			
2026	37																			
2026	38																			
2026	39																			
2026	40																			
2026	41																			
2026	42																			

2026	43																	
2026	44																	
2026	45																	
2026	46																	
2026	47																	
2026	48																	
2026	49																	
2026	50																	
2026	51																	
2026	52																	

/p SE 34

Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet