

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES

Boletín Semanal

Semana Epidemiológica 31

2 al 08 de agosto de 2026



Proteger la salud comienza desde los primeros días de vida. Por ello, Control de Vectores respalda la **lactancia materna** como un pilar fundamental para el crecimiento y bienestar de nuestros niños y niñas.

El Boletín Semanal de Control de Vectores del MINSA es una publicación técnica que describe el comportamiento de la vigilancia entomológica y las acciones de prevención y control de vectores de importancia en salud pública, integrando indicadores entomológicos, criaderos y control físico, químico y biológico.

EN ESTA EDICIÓN

01 Arbovirosis — Dengue, Zika, Chikungunya, Oropouche

03 Otras — Hantavirus, Leptospirosis

02 Parasitarias — Malaria, Chagas, Leishmaniasis

04 Comentarios y alertas sanitarias

ARBOVIROSIS

01 Dengue · Zika · Chikungunya



39,981
CRIADEROS
INSPECCIONADOS

8,549
CRIADEROS
TRATADOS

17,866
CRIADEROS
ELIMINADOS

59,093g
LARVICIDA ABATE

8,683
VIVIENDAS
NEBULIZADAS

770
MANZANAS
NEBULIZADAS

14,983
Predios
inspeccionados

3.3%
Índice
vivienda

3.5%
Índice
Breteau

1.3%
Índice
recipiente

Tabla I — Índices del *Aedes aegypti* por región



REGIÓN	VIVIENDA	BRETEAU	RECIP.
Bocas del Toro	● 1.7	1.7	0.8
Comarca Ngäbe Buglé	● 1.5	1.5	0.3
Coclé	● 0.6	0.6	0.2
Colón	● 6.4	6.4	2.4
Chiriquí	● 1.2	1.1	0.4
Darién	● 1.5	1.5	0.7
Herrera	● 2.1	2.4	2.5
Los Santos	● 1.5	1.5	1.1
Panamá Este	● 3.6	4.3	4.0
Panamá Metro	● 10.4	10.9	3.9
Panamá Oeste	● 3.8	3.8	0.9
Comarca Guna Yala	● 4.4	4.4	1.2
San Miguelito	● 6.4	7.1	1.4
Panamá Norte	● 5.4	6.3	1.6
Veraguas	● 1.2	1.2	1.2

● Bajo <1% ● Medio 1–<2% ● Alto ≥2%

Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores.


Mapa I — Índice de vivienda por región

Cada casilla muestra el índice de vivienda de la región (editable).



Del total de recipientes inspeccionados positivos, el **51% resultaron útiles** para la proliferación del vector, mientras que el **47% fueron inservibles**. De los recipientes útiles, el **62% resultaron positivos** a la presencia de larvas, lo que refleja el nivel de riesgo entomológico en las viviendas evaluadas.

Corregimientos con mayor riesgo de infestación



Prioridad: intervenir los corregimientos críticos, sostener el control en riesgo medio y mantener vigilancia en los <1%.

Vigilancia y control

Tabla II — Predios y rendimiento

REGIÓN	PREDIOS	DÍAS-H.	REND.
Bocas del Toro	716	35.5	20.2
C. Ngäbe Buglé	326	12	27.2
Coclé	1,163	49	23.7
Colón	472	18.5	25.5
Chiriquí	2,418	113	21.4
Darién	986	45	21.9
Herrera	1,124	52	21.6
Los Santos	917	35.9	25.5
Panamá Este	658	25.5	25.8
Panamá Metro	1,595	70	22.8
Panamá Oeste	759	35	21.7
Guna Yala	435	20	21.8
San Miguelito	1,211	62	19.5
Panamá Norte	554	27	20.5
Veraguas	1,649	71	23.2
Total	14,983	646	23.2

Tabla III — Control químico

REGIÓN	VIV. NEB.	MANZ. NEB.
Bocas del Toro	694	0
C. Ngäbe Buglé	0	0
Coclé	497	45
Colón	363	230
Chiriquí	1428	299
Darién	0	0
Herrera	257	0
Los Santos	187	69
Panamá Este	1083	0
Panamá Metro	1552	97
Panamá Oeste	967	0
Guna Yala	0	0
San Miguelito	920	0
Panamá Norte	540	30
Veraguas	195	0
TOTAL	8683	770

Tabla IV — Componente normativo de las acciones de vigilancia entomológica

Se listan las regiones con actuaciones registradas en la semana.

REGIÓN	COMPROMISO DE MEJORA	CITACIONES
Bocas del Toro	0	12
C. Ngäbe Buglé	5	0
Coclé	1	6
Chiriquí	5	8
Los Santos	0	3
Panamá Metro	6	18
Guna Yala	10	0
Panamá Norte	11	2
Total	38	49

ANÁLISIS DE LA SEMANA

Rendimiento operativo: Durante la semana evaluada, los Técnicos en Control de Vectores registraron un rendimiento promedio nacional de 26.061923812837 predios inspeccionados por día-hombre. Las regiones de Colón, Herrera, Comarca Ngäbe Buglé, Los Santos y Darién obtuvieron los mejores indicadores de productividad, superando el promedio nacional, mientras que Chiriquí y Panamá Metro concentraron la mayor carga operativa por el volumen de predios inspeccionados.

Acciones normativas: Como parte de las actividades de vigilancia y control sanitario, se formalizaron 38 compromisos de mejos y se emitieron 49 citaciones. Los compromisos de mejora se concentraron principalmente en la Comarca Ngäbe Buglé, Los Santos, Panamá Oeste y Panamá Norte, mientras que Panamá Metro registró el mayor número de citaciones (35), seguido de Chiriquí, Bocas del Toro y Los Santos, reflejando el fortalecimiento de las acciones dirigidas a promover el cumplimiento de las medidas sanitarias para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores



DENGUE

6,141

ZIKA

1

CHIKUNGUNYA

4

OROPOUCHE

19


DENGUE

Tabla V — Dengue por región

REGIÓN	ACUMULADO
Panamá Metro	1705
Colón	1444
Panamá Oeste	580
Chiriquí	547
San Miguelito	505
Bocas del Toro	386
Panamá Este	271
Panamá Norte	263
Herrera	163
Veraguas	95
Los Santos	62
Guna Yala	39
Coclé	35
C. Ngäbe Buglé	28
Darién	18
Total nacional	6141

Gráfico 1 — Casos confirmados por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



El **Dengue**, el **Zika** y el **Chikungunya** son transmitidos por el mosquito *Aedes aegypti* y se vigilan de forma conjunta mediante inspección domiciliaria, eliminación de criaderos y nebulización. El **Oropouche** se mantiene en seguimiento por su aparición reciente en el país. A la fecha se reportan **16 defunciones** asociadas a Dengue Grave en: 3 en Bocas del Toro y Los Santos; 2 en Metropolitana, Colón y Chiriquí; y 1 en Coclé, San Miguelito y Veraguas respectivamente.


OROPOUCHE

Tabla VI — Oropouche por región

REGIÓN	CASOS
Herrera	4
Panamá Metro	3
Panamá Este	3
Darién	2
San Miguelito	2
C. Ngäbe Buglé	1
Chiriquí	1
Coclé	1
Panamá Oeste	1
Guna Yala	1
Total general	19

Gráfico 2 — Casos confirmados por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



El **Oropouche** es una arbovirosis de aparición reciente en el país; se mantiene bajo seguimiento epidemiológico estrecho por su potencial de transmisión. La mayor afectación se concentra en **Panamá Este**, con casos aislados en Herrera, Comarca Ngäbe Buglé, San Miguelito y Darién.

Gráfico 3 — Casos confirmados de malaria por semana epidemiológica

Comparativo 2026 vs. 2025, hasta la semana epidemiológica evaluada.





Tabla VII — Indicadores acumulados por región endémica

Región	Diagnosticados en 48 h %	Tratados en 24 h %	Muestras de seguimiento	Casos confirmados con tratamiento finalizado %	Tasa de positividad %
C. Ngäbe Buglé	46.9%	89.4%	168	89.4%	1.6%
Darién	68.0%	82.6%	483	49.8%	22.9%
Guna Yala	80.7%	91.1%	1,804	75.2%	27.8%
Panamá Este	72.7%	19.9%	3	16.7%	68.7%
Veraguas	28.2%	94.9%	67	71.8%	2.1%

Mapa II — Distribución de casos confirmados de malaria




Casos confirmados de malaria (MAL) en los últimos 30 días, por distrito y región de salud. Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores.

ENFERMEDADES PARASITARIAS · MALARIA

02

Indicadores por región endémica

Tabla VIII — Clasificación de caso por región endémica



Datos utilizados por variable de Región de notificación

Tabla XI — Muestras por tipo de detección

REGIÓN DE SALUD	SE 31				ACUMULADO (SE 1-31)			
	PASIVA	PROACTIVA	REACTIVA	SEGUIM.	PASIVA	PROACTIVA	REACTIVA	SEGUIM.
Bocas del Toro	0	0	0	0	3	0	1	0
C. Ngäbe Buglé	0	1	0	1	33	25	40	10
Chiriquí	0	0	0	0	6	0	0	3
Colón	0	0	0	0	18	4	0	1
Darién	0	0	0	0	354	93	414	2
Herrera	1	0	0	1	11	0	0	0
Guna Yala	13	4	1	18	922	16	710	144
Los Santos	0	0	0	0	2	0	0	0
Panamá Este	0	0	0	0	815	178	967	1
Panamá Metro	1	0	0	1	78	4	36	4
Panamá Norte	0	0	0	0	4	0	0	1
Panamá Oeste	0	0	0	0	40	3	1	7
San Miguelito	0	0	0	0	17	2	0	0
Veraguas	1	0	0	1	23	0	16	0
Total	16	5	1	22	2,326	325	2,185	173

Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores. Regiones endémicas: Kuna Yala, Darién, Panamá Este, Comarca Ngäbe Buglé y Veraguas.

Gráfico 4 — Muestreo por tipo de notificador

República de Panamá, distribución mensual acumulada año 2026.





Gráfico 5 — Tasa de positividad por región de salud según semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores. Regiones endémicas.

Focos con mayor número de casos

Mulatupu	1179 SE31:11	Ipetí Kuna	700 SE31:0	Akua Yala	539 SE31:0
Puerto Limón	538 SE31:0	Playón Chico	303 SE31:2	Puerto Obaldía	259 SE31:4
Fé-Metetí y Yaviza	67 SE31:0	Lajas Blancas	98 SE31:0	Comarca Wargandi	456 SE31:0
Cartí	73 SE31:1	Río Chiriquí	67 SE31:1	Jaqué	17 SE31:1
Santa Catalina	42 SE31:0	Tucutí	64 SE31:0	Unión Chocó	14 SE31:0
Río Concepción	10 SE31:0	Río Luis	13 SE31:0		

Datos utilizados por variable de Focos de residencia

Nota: Las actividades de control vectorial para Chagas no se ejecutan durante este periodo, debido a la priorización de otras acciones consideradas urgentes dentro del programa de salud pública. Se prevé retomar estas actividades en cuanto las condiciones operativas lo permitan, asegurando la continuidad de las acciones de prevención y control a mediano y largo plazo.

Tabla XIII — Vigilancia de Chagas

INDICADOR	P. OESTE Capira-Cacao
Viviendas existentes	12
Viviendas inspeccionadas	5
Cobertura de inspección	41.7%
Viviendas infestadas	0
Índice de infestación	0.0%
Control químico	0
Habitantes protegidos	35

Tabla XIV — Casos confirmados de Chagas

Panamá Oeste		8
Panamá Metro		5
Coclé		5
Panamá Este		3
Panamá Norte		3
Chiriquí		2
Veraguas		1
C. Ngäbe Buglé		1
Los Santos		1
Bocas del Toro		1
San Miguelito		1
Herrera		1
Total general		32

Durante el período evaluado se registra un acumulado nacional de 32 casos. La mayor concentración se observa en PANAMA OESTE con 8 casos; en un segundo nivel, PANAMA METRO y COCLE con 5 casos cada una. El comportamiento evidencia una distribución focalizada y una situación epidemiológica de baja incidencia.

Gráfico 6 — Casos confirmados de Chagas por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.




Tabla XV — Vigilancia de Leishmaniasis

INDICADOR	P. OESTE	VERAGUAS
Pedios inspeccionados	12	15
Pedios con infestación	5	0
Índice de infestación	0%	0.0%
Casos recientes	5	0
Casos sospechosos	1	0
Control químico	1	0
Insecticida utilizado	1	0.5
Habitantes investigados	36	39

Tabla XVI — Casos confirmados de Leishmaniasis


Bocas del Toro		291
Panamá Oeste		214
C. Ngäbe Buglé		96
Veraguas		68
Panamá Norte		62
Coclé		56
Panamá Metro		51
Colón		37
Chiriquí		31
Panamá Este		30
San Miguelito		13
Los Santos		6
Darién		5
Herrera		1
Total general		961

Durante el período evaluado se registra un acumulado nacional de 1 casos, evidenciando un incremento respecto al reporte previo. La mayor concentración se observa en Bocas del Toro (291), seguido de PANAMA OESTE (214) y C. NGOBE BUGLE (96).

En un nivel intermedio se ubican Veraguas (68), PANAMA NORTE (62) y COCLE (56). Las menores frecuencias se registran en PANAMA METRO (51), COLON (37), CHIRIQUI (31), PANAMA ESTE (30), SAN MIGUELITO (13), Los Santos (6) y DARIEN (5).

Gráfico 7 — Casos confirmados de Leishmaniasis por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



Hantavirus — Vigilancia entomológica

Tabla XVII — Acciones de vigilancia entomológica para Hantavirus

REGIÓN	MANZ. TRAB.	PREDIOS INSP.	TRATADOS	FACTORES DE RIESGO								PRESENCIA DE ROEDORES		RODENTICIDA		TRAMPAS				ROED. CAPT.
				1	2	3	4	5	6	7		VIVOS	MUERTOS	F	P	Nº	S	DG	J	
TOTALES	295	5,995	133	1,771	1,804	581.5	618	595	1,203.5	1,559		18	1	2,760	6,405					0
Bocas del Toro	6	18	18	8	0	1	1	0	7	0		0	1	0	1,000					
Coclé	34	1,163	4	783	754	1	156	303	511	947		0	0	0	320					
Colón	1	2	2	0	0	0.5	0	0	0.5	0		0	0	0	1					
Chiriquí	125	2,678	16	564	576	295	196	116	352	146		2	0	0	304					
Darién																				
Herrera	45	1,124	24	276	315	161	143	78	177	197		0	0	0	3,280					
Los Santos	64	917	22	95	97	70	74	71	116	264		0	0	1,000	0					
Panamá Metro																				
Panamá Este	7	25	25	25	15	19	6	2	8	0		15	0	1,760	0					
Panamá Oeste	8	12	12	12	12	3	2	2	2	2		1	0	0	500					
Panamá Norte	2	10	10	0	0	2	5	3	5	3		0	0	0	1,000					
San Miguelito																				
Veraguas	3	46		8	35	29	35	20	25	0		0	0	0	0					
C. Kuna Yala																				
C. Ngäbe Buglé																				

Fuente: Departamento de Control de Vectores. Las regiones sin registros no realizaron esta actividad durante la semana evaluada.

RODENTICIDA

F Fresco · P Parafinado

TIPO DE TRAMPA

S Sherman · DG De golpe o guillotina · J Jaula

FACTORES DE RIESGO

1 Granos dentro de la vivienda · 2 Cultivos y potreros a <30 m · 3 Patio sucio (maleza) · 4 Aguas servidas · 5 Chatarras · 6 Basura · 7 Otros

ANÁLISIS

A nivel nacional se intervinieron 295.0 manzanas y 5995.0 predios inspeccionados, de los cuales 133.0 fueron tratados. Predominaron los factores de riesgo 1 (1771.0) y 2 (1804.0). La captura efectiva fue limitada: 18 roedores vivos y 2760 muertos. y lideraron la carga operativa.

Hantavirus y Leptospirosis — Casos

Tabla XVIII — Casos confirmados de Hantavirus

REGIÓN	SCPH	FIEBRE
Los Santos	5	7
Herrera	4	2
Coclé	4	1
Veraguas	2	2
Total	15	12

Hasta la SE 31 se acumulan **27 casos confirmados de Hantavirus**: el **55.6% (n=15)** corresponde a Síndrome cardiopulmonar por hantavirus y el **44.4% (n=12)** a fiebre por hantavirus, con ligero predominio de la forma grave (SCPH). La mayor concentración se registra en **Los Santos (44.4%, n=12)**, seguida de **Herrera (22.2%, n=6)** y **Coclé (18.5%, n=5)**.

Tabla XIX — Casos confirmados de Leptospirosis

REGIÓN	CASOS
Colón	7
Chiriquí	6
C. Ngäbe Buglé	4
Bocas del Toro	3
Coclé	3
Herrera	2
Veraguas	2
Panamá Metro	2
Darién	1
Panamá Oeste	1
Total	31

Se acumulan 1 casos confirmados de leptospirosis a nivel nacional. La mayor afectación se observa en COLON (7); le siguen CHIRIQUI y C. NGOBE BUGLE con 6 casos cada una. En un nivel menor se registran Bocas del Toro (3), COCLE (3), Herrera (2), Veraguas (2), PANAMA METRO (2) y DARIEN (1). Comportamiento estable y acorde a un patrón endémico.

Gráfico 8 — Hantavirus por semana epidemiológica

Casos confirmados de SCPH y fiebre por hantavirus.





Gráfico 9 — Leptospirosis por semana epidemiológica

Casos confirmados a nivel nacional.



Equipo Nacional de Control de Vectores

Unidos contra el dengue: brigadas binacionales Costa Rica–Panamá refuerzan la nebulización en la zona fronteriza

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ABORDAJE COMUNITARIO

En respuesta a la situación actual del dengue, las autoridades de salud de **Costa Rica** y **Panamá** han intensificado sus acciones de control de vectores en la región fronteriza. Brigadas de ambos países realizan jornadas de fumigación y control de criaderos para detener la propagación del mosquito transmisor, el *Aedes aegypti*.

El esfuerzo conjunto busca proteger la salud de las comunidades que habitan en esta zona de alta movilidad, donde el riesgo de transmisión es elevado. Se hace un llamado a la población a colaborar con las brigadas, siguiendo las recomendaciones de prevención. La **eliminación de criaderos** en casas y patios es fundamental para el éxito de esta estrategia.

Juntos podemos ganarle la batalla al dengue.

Departamento de Control de Vectores — MINSA



Brigadas binacionales de Costa Rica y Panamá durante las jornadas de nebulización y control de criaderos en la zona fronteriza.



SECCIÓN DE COMENTARIOS Y ALERTAS

Alerta Sanitaria por Malaria

RESOLUCIÓN N.º 020 DEL 24 DE ENERO DE 2023

Se decretó alerta sanitaria para el combate de la malaria, optimizando recursos para la vigilancia, monitoreo y control.

Alerta Sanitaria por Dengue

RESOLUCIÓN N.º 1580 DEL 25 DE JULIO DE 2024

Declara alerta sanitaria por dengue en las regiones de Panamá Metro, Colón, Panamá Oeste y Panamá Este, con énfasis focalizado en los corregimientos con mayor incidencia.

Crisis hídrica por contaminación del río La Villa y sus afluentes

RESOLUCIÓN N.º 56 DEL 10 DE JUNIO DE 2025

Declara el estado de emergencia en las provincias de Herrera y Los Santos y dicta otras disposiciones.

Estado de Emergencia en Bocas del Toro

RESOLUCIÓN N.º 48 DEL 27 DE MAYO DE 2025

Declara el estado de emergencia en la provincia de Bocas del Toro y dicta otras disposiciones.