

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES

Boletín Semanal

Semana Epidemiológica 32

9 al 15 de agosto de 2026



9 de agosto

Día Internacional de los Pueblos Indígenas

El Departamento de Control de Vectores reconoce y valora la interculturalidad y los saberes ancestrales como pilares fundamentales para fortalecer la salud, la prevención y el bienestar de nuestras comunidades.

El Boletín Semanal de Control de Vectores del MINSA es una publicación técnica que describe el comportamiento de la vigilancia entomológica y las acciones de prevención y control de vectores de importancia en salud pública, integrando indicadores entomológicos, criaderos y control físico, químico y biológico.

EN ESTA EDICIÓN

01 Arbovirosis — Dengue, Zika, Chikungunya, Oropouche

03 Otras — Hantavirus, Leptospirosis

02 Parasitarias — Malaria, Chagas, Leishmaniasis

04 Comentarios y alertas sanitarias

ARBOVIROSIS

01 Dengue · Zika · Chikungunya



46,424
CRIADEROS
INSPECCIONADOS

10,871
CRIADEROS
TRATADOS

22,101
CRIADEROS
ELIMINADOS

58,295g
LARVICIDA ABATE

7,306
VIVIENDAS
NEBULIZADAS

1,096
MANZANAS
NEBULIZADAS

16,690
Predios
inspeccionados

2.9%
Índice
vivienda

3.1%
Índice
Breteau

1.1%
Índice
recipiente

Tabla I — Índices del *Aedes aegypti* por región



REGIÓN	VIVIENDA	BRETEAU	RECIP.
Bocas del Toro	● 1.6	1.4	0.5
Comarca Ngäbe Buglé	● 1.0	1.0	0.1
Coclé	● 0.3	0.3	0.1
Colón	● 12.2	12.2	4.1
Chiriquí	● 0.5	0.6	0.2
Darién	● 2.5	3.0	1.1
Herrera	● 2.5	2.5	2.2
Los Santos	● 3.0	3.0	2.6
Panamá Este	● 4.0	4.3	2.7
Panamá Metro	● 5.3	5.9	2.2
Panamá Oeste	● 4.7	4.8	1.0
Comarca Guna Yala	● 3.5	3.5	1.2
San Miguelito	● 3.8	4.1	0.8
Panamá Norte	● 4.5	5.5	1.5
Veraguas	● 1.0	1.0	0.9

● Bajo <1% ● Medio 1–<2% ● Alto ≥2%

Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores.


Mapa I — Índice de vivienda por región

Cada casilla muestra el índice de vivienda de la región (editable).



Del total de recipientes inspeccionados positivos, el **50% resultaron útiles** para la proliferación del vector, mientras que el **47% fueron inservibles**. De los recipientes útiles, el **65% resultaron positivos** a la presencia de larvas, lo que refleja el nivel de riesgo entomológico en las viviendas evaluadas.

Corregimientos con mayor riesgo de infestación



Prioridad: intervenir los corregimientos críticos, sostener el control en riesgo medio y mantener vigilancia en los <1%.

Vigilancia y control

Tabla II — Predios y rendimiento

REGIÓN	PREDIOS	DÍAS-H.	REND.
Bocas del Toro	622	32.5	19.1
C. Ngäbe Buglé	193	9	21.4
Coclé	1,020	38	26.8
Colón	475	18.5	25.7
Chiriquí	2,517	116.5	21.6
Darién	1,081	57	19
Herrera	1,328	57	23.3
Los Santos	1,039	46.2	22.5
Panamá Este	699	34.5	20.3
Panamá Metro	1,657	70.5	23.5
Panamá Oeste	1,095	54	20.3
Guna Yala	926	48	19.3
San Miguelito	1,705	82	20.8
Panamá Norte	583	28	20.8
Veraguas	1,750	76	23
Total	16,690	768	21.7

Tabla III — Control químico

REGIÓN	VIV. NEB.	MANZ. NEB.
Bocas del Toro	228	0
C. Ngäbe Buglé	57	0
Coclé	384	94
Colón	828	323
Chiriquí	1,053	339
Darién	0	0
Herrera	325	56
Los Santos	166	35
Panamá Este	87	0
Panamá Metro	1,024	213
Panamá Oeste	1,092	0
Guna Yala	45	0
San Miguelito	1,356	0
Panamá Norte	575	36
Veraguas	86	0
TOTAL	7,306	1,096

Tabla IV — Componente normativo de las acciones de vigilancia entomológica

Se listan las regiones con actuaciones registradas en la semana.

REGIÓN	COMPROMISO DE MEJORA	CITACIONES
Bocas del Toro	0	10
C. Ngäbe Buglé	4	0
Coclé	1	3
Chiriquí	4	6
Panamá Este	6	1
Panamá Metro	3	5
Panamá Oeste	8	1
Guna Yala	9	0
Panamá Norte	7	2
Total	42	28

ANÁLISIS DE LA SEMANA

Rendimiento operativo: durante la semana evaluada, los Técnicos en Control de Vectores registraron un rendimiento promedio nacional de **21.7 predios inspeccionados por día-hombre**. Coclé (26.8), Colón (25.7), Panamá Metro (23.5) y Herrera (23.3) obtuvieron los mejores indicadores de productividad, superando el promedio nacional, mientras que **Chiriquí (2,517 predios)**, Veraguas (1,750) y San Miguelito (1,705) concentraron la mayor carga operativa por el volumen de predios inspeccionados.

Acciones normativas: como parte de las actividades de vigilancia y control sanitario, se formalizaron **42 compromisos de mejora** y se emitieron **28 citaciones**. Los compromisos de mejora se concentraron principalmente en Guna Yala (9), Panamá Oeste (8), Panamá Norte (7) y Panamá Este (6), mientras que **Bocas del Toro** registró el mayor número de citaciones (10), seguido de Chiriquí (6) y Panamá Metro (5), reflejando el fortalecimiento de las acciones dirigidas a promover el cumplimiento de las medidas sanitarias para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores.



DENGUE

6,616

ZIKA

1

CHIKUNGUNYA

4

OROPOUCHE

19


DENGUE

Tabla V — Dengue por región

REGIÓN	ACUMULADO
Panamá Metro	1,780
Colón	1,595
Panamá Oeste	637
Chiriquí	617
San Miguelito	539
Bocas del Toro	400
Panamá Norte	304
Panamá Este	292
Herrera	166
Veraguas	96
Los Santos	64
Guna Yala	39
Coclé	36
C. Ngäbe Buglé	33
Darién	18
Total nacional	6,616

Gráfico 1 — Casos confirmados por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



El **Dengue**, el **Zika** y el **Chikungunya** son transmitidos por el mosquito *Aedes aegypti* y se vigilan de forma conjunta mediante inspección domiciliaria, eliminación de criaderos y nebulización. El **Oropouche** se mantiene en seguimiento por su aparición reciente en el país. A la fecha se reportan **16 defunciones** asociadas a Dengue Grave en: 3 en Bocas del Toro y Los Santos; 2 en Metropolitana, Colón y Chiriquí; y 1 en Coclé, San Miguelito y Veraguas respectivamente.


OROPOUCHE

Tabla VI — Oropouche por región

REGIÓN	CASOS
Herrera	4
Panamá Metro	3
Panamá Este	3
San Miguelito	2
Darién	2
C. Ngäbe Buglé	1
Chiriquí	1
Panamá Oeste	1
Guna Yala	1
Coclé	1
Total general	19

Gráfico 2 — Casos confirmados por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



El **Oropouche** es una arbovirosis de aparición reciente en el país; se mantiene bajo seguimiento epidemiológico estrecho por su potencial de transmisión. La mayor afectación se concentra en **Panamá Este**, con casos aislados en Herrera, Comarca Ngäbe Buglé, San Miguelito y Darién.

Gráfico 3 — Casos confirmados de malaria por semana epidemiológica

Comparativo 2026 vs. 2025, hasta la semana epidemiológica evaluada.





Tabla VII — Indicadores acumulados por región endémica

Región	Diagnosticados en 48 h %	Tratados en 24 h %	Muestras de seguimiento	Casos confirmados con tratamiento finalizado %	Tasa de positividad %
C. Ngäbe Buglé	46.9%	89.4%	190	89.4%	1.5%
Darién	68.9%	82.5%	483	50.2%	23.4%
Guna Yala	80.5%	90.9%	1,817	75.3%	27.9%
Panamá Este	72.5%	19.8%	3	16.6%	68.8%
Veraguas	28.2%	94.9%	68	71.8%	2.0%

Mapa II — Distribución de casos confirmados de malaria




Casos confirmados de malaria (MAL) en los últimos 30 días, por distrito y región de salud. Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores.

ENFERMEDADES PARASITARIAS · MALARIA

02

Indicadores por región endémica

Tabla VIII — Clasificación de caso por región endémica



Datos utilizados por variable de Región de notificación

Tabla XI — Muestras por tipo de detección

REGIÓN DE SALUD	SE 32				ACUMULADO (SE 1-32)			
	PASIVA	PROACTIVA	REACTIVA	SEGUIM.	PASIVA	PROACTIVA	REACTIVA	SEGUIM.
Bocas del Toro	0	0	0	0	3	0	1	0
C. Ngäbe Buglé	0	0	0	0	34	25	44	10
Chiriquí	1	0	0	0	7	0	0	3
Colón	0	0	0	0	18	4	0	1
Darién	0	0	0	0	360	94	436	2
Herrera	0	0	0	0	11	0	0	0
Guna Yala	0	0	0	0	922	16	710	144
Los Santos	0	0	0	0	2	0	0	0
Panamá Este	1	0	0	0	819	179	973	1
Panamá Metro	0	0	0	0	81	5	37	4
Panamá Norte	0	0	0	0	4	0	0	1
Panamá Oeste	1	0	0	0	41	3	1	7
San Miguelito	0	0	0	0	17	2	0	0
Veraguas	0	0	0	0	23	0	17	0
Total	3	0	0	0	2,342	328	2,219	173

Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores. Regiones endémicas: Kuna Yala, Darién, Panamá Este, Comarca Ngäbe Buglé y Veraguas.

Gráfico 4 — Muestreo por tipo de notificador

República de Panamá, distribución mensual acumulada año 2026.





Gráfico 5 — Tasa de positividad por región de salud según semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores. Regiones endémicas.

Focos con mayor número de casos

Mulatupu	1,133 SE32:0	Ipetí Kuna	687 SE32:0	Akua Yala	524 SE32:0
Puerto Limón	522 SE32:1	Comarca Wargandi	436 SE32:0	Playón Chico	292 SE32:0
Puerto Obaldía	254 SE32:0	Lajas Blancas	96 SE32:0	Tucutí	85 SE32:0
Cartí	71 SE32:0	Río Chiriquí	70 SE32:1	Fé-Metetí y Yaviza	66 SE32:0
Santa Catalina	43 SE32:0	Jaqué	21 SE32:0	Unión Chocó	13 SE32:0
Río Luis	13 SE32:0	Río Concepción	10 SE32:0		

Datos utilizados por variable de Focos de residencia

Nota: Las actividades de control vectorial para Chagas no se ejecutan durante este periodo, debido a la priorización de otras acciones consideradas urgentes dentro del programa de salud pública. Se prevé retomar estas actividades en cuanto las condiciones operativas lo permitan, asegurando la continuidad de las acciones de prevención y control a mediano y largo plazo.

Tabla XIII — Vigilancia de Chagas

INDICADOR	CHIRIQUÍ	P. OESTE
Viviendas existentes	10	21
Viviendas inspeccionadas	7	21
Cobertura de inspección	70.0%	100.0%
Viviendas infestadas	0	0
Índice de infestación	0.0%	0.0%
Control químico	0	0
Habitantes protegidos	50	77

Tabla XIV — Casos confirmados de Chagas

Panamá Oeste		8
Panamá Metro		6
Coclé		5
Panamá Este		3
Panamá Norte		3
Chiriquí		2
Veraguas		1
C. Ngäbe Buglé		1
Los Santos		1
Bocas del Toro		1
San Miguelito		1
Herrera		1
Total general		33

Durante el período evaluado se registra un acumulado nacional de **33 casos**. La mayor concentración se observa en **Panamá Oeste con 8 casos**; en un segundo nivel, **Panamá Metro con 6** y **Coclé con 5**. El comportamiento evidencia una **distribución focalizada** y una situación epidemiológica de **baja incidencia**, lo que resalta la importancia de sostener la vigilancia activa para prevenir incrementos en la transmisión.

Gráfico 6 — Casos confirmados de Chagas por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.




Tabla XV — Vigilancia de Leishmaniasis

INDICADOR	P. OESTE Capira-CHame
Predios inspeccionados	26
Predios con infestación	26
Índice de infestación	0.0%
Casos recientes	12
Casos sospechosos	2
Control químico	26
Insecticida utilizado	1
Habitantes investigados	97

Tabla XVI — Casos confirmados de Leishmaniasis


Bocas del Toro		298
Panamá Oeste		243
C. Ngäbe Buglé		96
Veraguas		68
Panamá Norte		62
Coclé		56
Panamá Metro		53
Colón		39
Chiriquí		31
Panamá Este		30
San Miguelito		13
Los Santos		6
Darién		5
Herrera		1
Total general		1001

Durante el período evaluado se registra un acumulado nacional de **1,001 casos**, evidenciando un incremento respecto al reporte previo. La mayor concentración se observa en **Bocas del Toro (298)**, seguido de **Panamá Oeste (243)** y **C. Ngäbe Buglé (96)**, manteniéndose como las regiones de mayor carga a nivel nacional.

En un nivel intermedio se ubican Veraguas (68), Panamá Norte (62) y Coclé (56). Las menores frecuencias se registran en Panamá Metro (53), Colón (39), Chiriquí (31), Panamá Este (30), San Miguelito (13), Los Santos (6), Darién (5) y Herrera (1).

Gráfico 7 — Casos confirmados de Leishmaniasis por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



Hantavirus — Vigilancia entomológica

Tabla XVII — Acciones de vigilancia entomológica para Hantavirus

REGIÓN	MANZ. TRAB.	PREDIOS INSP.	TRATADOS	FACTORES DE RIESGO							PRESENCIA DE ROEDORES		RODENTICIDA		TRAMPAS				ROED. CAPT.
				1	2	3	4	5	6	7	VIVOS	MUERTOS	F	P	Nº	S	DG	J	
TOTALES	290	6,814	163	1,990	1,705	953.5	717	674	1,505.5	1,745	9	3	1,080	9,624					0
Bocas del Toro	5	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180					0
Coclé	34	1,163	4	783	754	205	156	303	511	947	0	0	0	320					0
Colón	2	122	13			2.5	2	0	1.5	0	0	0	0	2					0
Chiriquí	124	2,955	42	647	501	310	192	148	392	124	0	0	0	604					0
Darién																			0
Herrera	60	1,328	24	392	214	286	183	109	386	342	0	0	0	2,900					0
Los Santos	52	1,039	13	122	177	94	120	69	165	298	0	0	1,080	0					0
Panamá Metro																			0
Panamá Este																			0
Panamá Oeste	5	66	26	37	34	27	24	13	21	9	0	0	0	1,178					0
Panamá Norte	1	5	5	0	0	3	3	2	5	2	0	0	0	500					0
San Miguelito	4	7	7	0	0	7	5	0	6	3	9	3	0	3,540					0
Veraguas	3	120	20	0	25	19	32	30	18	20	0	0	0	400					0
C. Kuna Yala																			0
C. Ngäbe Buglé																			0

Fuente: Departamento de Control de Vectores. Las regiones sin registros no realizaron esta actividad durante la semana evaluada.

RODENTICIDA

F Fresco · P Parafinado

TIPO DE TRAMPA

S Sherman · DG De golpe o guillotina · J Jaula

FACTORES DE RIESGO

1 Granos dentro de la vivienda · 2 Cultivos y potreros a <30 m · 3 Patio sucio (maleza) · 4 Aguas servidas · 5 Chatarras · 6 Basura · 7 Otros

ANÁLISIS

A nivel nacional se intervinieron **290 manzanas** y **6,814 predios inspeccionados**, de los cuales **163 fueron tratados**. Predominaron los factores de riesgo **1 (1,990)** y **2 (1,705)**, condiciones favorables para la proliferación de roedores. La captura efectiva fue limitada: **9 roedores vivos y 3 muertos**. **Herrera** (1,328 predios) lideró la carga operativa.

Hantavirus y Leptospirosis — Casos

Tabla XVIII — Casos confirmados de Hantavirus

REGIÓN	SCPH	FIEBRE
Los Santos	5	7
Herrera	5	2
Coclé	4	1
Veraguas	2	2
Bocas del Toro	0	1
Total	16	13

Hasta la SE 32 se acumulan **29 casos confirmados de Hantavirus**: el **55.2% (n=16)** corresponde a Síndrome cardiopulmonar por hantavirus y el **44.8% (n=13)** a fiebre por hantavirus, con ligero predominio de la forma grave (SCPH). La mayor concentración se registra en **Los Santos (41.4%, n=12)**, seguida de **Herrera (24.1%, n=7)** y **Coclé (17.2%, n=5)**.

Tabla XIX — Casos confirmados de Leptospirosis

REGIÓN	CASOS
Colón	7
Chiriquí	6
C. Ngäbe Buglé	5
Coclé	5
Bocas del Toro	3
Herrera	2
Veraguas	2
Panamá Metro	2
Darién	1
Panamá Oeste	1
Total	34

Se acumulan **34 casos confirmados de leptospirosis** a nivel nacional. La mayor afectación se observa en **Colón (7 casos)**, seguido de **Chiriquí (6)**; en un tercer nivel, C. Ngäbe Buglé y Coclé con 5 cada una. En un nivel menor se registran Bocas del Toro (3), Herrera (2), Veraguas (2), Panamá Metro (2), Darién (1) y Panamá Oeste (1). El total nacional refleja un **comportamiento estable y acorde a un patrón endémico**, sin incremento inusual en la presente semana epidemiológica.

Gráfico 8 — Hantavirus por semana epidemiológica

Casos confirmados de SCPH y fiebre por hantavirus.





Gráfico 9 — Leptospirosis por semana epidemiológica

Casos confirmados a nivel nacional.



Equipo Nacional de Control de Vectores

Intensifican acciones de control vectorial en regiones priorizadas durante la Semana Epidemiológica N.º 32

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ABORDAJE COMUNITARIO

Como parte de la respuesta integral ante la situación epidemiológica actual del dengue, el Departamento de Control de Vectores intensificó sus intervenciones en las regiones de salud de **San Miguelito, Metropolitana, Colón y Panamá Oeste**.

Entre las principales intervenciones ejecutadas destacan las inspecciones domiciliarias, la eliminación de criaderos y las jornadas de nebulización, dirigidas a reducir la población del mosquito adulto *Aedes aegypti*, principal vector transmisor del dengue. Estas estrategias buscan interrumpir la cadena de transmisión y disminuir el riesgo de nuevos casos en las comunidades priorizadas.

El Departamento de Control de Vectores reafirma que, si bien las acciones institucionales son fundamentales para el control de la enfermedad, la **eliminación de criaderos en los hogares** y sus alrededores continúa siendo la medida de mayor impacto para prevenir la proliferación del mosquito transmisor.

RECOMENDACIONES

Se hace un llamado a la población a mantener patios y recipientes libres de agua estancada, tapar adecuadamente los depósitos de almacenamiento de agua y colaborar activamente con las acciones de prevención impulsadas por los equipos de salud.

La participación comunitaria y el trabajo articulado entre la población y los servicios de salud son esenciales para fortalecer la respuesta contra el dengue y proteger la salud de todos.

Departamento de Control de Vectores — MINSA



Inspección domiciliaria y eliminación de criaderos en una de las regiones de salud priorizadas durante la semana evaluada.

⚠ SECCIÓN DE COMENTARIOS Y ALERTAS

Alerta Sanitaria por Malaria

RESOLUCIÓN N.º 020 DEL 24 DE ENERO DE 2023

Se decretó alerta sanitaria para el combate de la malaria, optimizando recursos para la vigilancia, monitoreo y control.

Alerta Sanitaria por Dengue

RESOLUCIÓN N.º 1580 DEL 25 DE JULIO DE 2024

Declara alerta sanitaria por dengue en las regiones de Panamá Metro, Colón, Panamá Oeste y Panamá Este, con énfasis focalizado en los corregimientos con mayor incidencia.

Crisis hídrica por contaminación del río La Villa y sus afluentes

RESOLUCIÓN N.º 56 DEL 10 DE JUNIO DE 2025

Declara el estado de emergencia en las provincias de Herrera y Los Santos y dicta otras disposiciones.

Estado de Emergencia en Bocas del Toro

RESOLUCIÓN N.º 48 DEL 27 DE MAYO DE 2025

Declara el estado de emergencia en la provincia de Bocas del Toro y dicta otras disposiciones.