

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES

Boletín Semanal

Semana Epidemiológica 28

12 al 18 de julio de 2026



El Boletín Semanal de Control de Vectores del MINSA es una publicación técnica que describe el comportamiento de la vigilancia entomológica y las acciones de prevención y control de vectores de importancia en salud pública, integrando indicadores entomológicos, criaderos y control físico, químico y biológico.

EN ESTA EDICIÓN

01 Arbovirosis — Dengue, Zika, Chikungunya, Oropouche

03 Otras — Hantavirus, Leptospirosis

02 Parasitarias — Malaria, Chagas, Leishmaniasis

04 Comentarios y alertas sanitarias

ARBOVIROSIS

01 Dengue · Zika · Chikungunya



43,963
CRIADEROS
INSPECCIONADOS

11,211
CRIADEROS
TRATADOS

19,056
CRIADEROS
ELIMINADOS

53,345^g
LARVICIDA ABATE

7,351
VIVIENDAS
NEBULIZADAS

769
MANZANAS
NEBULIZADAS

16,130
Predios
inspeccionados

3.0%
Índice
vivienda

3.5%
Índice
Breteau

1.3%
Índice
recipiente

Tabla I — Índices del *Aedes aegypti* por región



REGIÓN	VIVIENDA	BRETEAU	RECIP.
Bocas del Toro	● 1.9	1.8	0.5
Comarca Ngäbe Buglé	● 1.3	1.3	0.4
Coclé	● 0.2	0.1	0.0
Colón	● 6.5	6.5	2.0
Chiriquí	● 1.3	1.3	0.5
Darién	● 1.2	1.2	0.3
Herrera	● 2.4	2.4	2.2
Los Santos	● 1.5	1.5	1.1
Panamá Este	● 2.9	4.2	2.2
Panamá Metro	● 10.8	12.2	3.3
Panamá Oeste	● 2.2	2.2	0.9
Comarca Guna Yala	● 3.3	3.3	1.1
San Miguelito	● 7.5	8.0	1.9
Panamá Norte	● 2.4	2.4	0.9
Veraguas	● 1.3	1.3	1.1

● Bajo <1% ● Medio 1–<2% ● Alto ≥2%

Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores.


Mapa I — Índice de vivienda por región

Cada casilla muestra el índice de vivienda de la región (editable).



Del total de recipientes inspeccionados, el 50% resultaron útiles para la proliferación del vector, mientras que el 48% fueron inservibles. De los recipientes útiles, el 68% resultaron positivos a la presencia de larvas.

Corregimientos con mayor riesgo de infestación



Prioridad: intervenir los corregimientos críticos, sostener el control en riesgo medio y mantener vigilancia en los <1%.

Vigilancia y control

Tabla II — Predios y rendimiento

REGIÓN	PREDIOS	DÍAS-H.	REND.
Bocas del Toro	980	47.5	20.6
C. Ngäbe Buglé	373	17	21.9
Coclé	849	34	25
Colón	1,114	41	27.2
Chiriquí	2,297	98	23.4
Darién	675	31	21.8
Herrera	917	39	23.5
Los Santos	1,071	45	23.8
Panamá Este	624	27.5	22.7
Panamá Metro	1,382	68	20.3
Panamá Oeste	1,156	47	24.6
Guna Yala	1,065	46	23.2
San Miguelito	1,218	70	17.4
Panamá Norte	543	26	20.9
Veraguas	1,866	85	22
Total	16,130	694.5	23.2

Tabla III — Control químico

REGIÓN	VIV. NEB.	MANZ. NEB.
Bocas del Toro	515	0
C. Ngäbe Buglé	62	0
Coclé	220	96
Colón	545	193
Chiriquí	1128	207
Darién	0	0
Herrera	126	0
Los Santos	178	108
Panamá Este	108	0
Panamá Metro	1111	43
Panamá Oeste	1175	0
Guna Yala	450	0
San Miguelito	995	74
Panamá Norte	515	48
Veraguas	223	0
TOTAL	7351	769

Tabla IV — Componente normativo de las acciones de vigilancia entomológica

Se listan las regiones con actuaciones registradas en la semana.

REGIÓN	COMPROMISO DE MEJORA	CITACIONES
Bocas del Toro	0	19
C. Ngäbe Buglé	2	0
Coclé	1	1
Chiriquí	0	7
Los Santos	2	2
Panamá Este	2	0
Panamá Metro	6	2
Panamá Oeste	6	1
Guna Yala	0	5
Panamá Norte	4	0
Total	23	37

ANÁLISIS DE LA SEMANA

Rendimiento operativo: Durante la semana evaluada, los Técnicos en Control de Vectores registraron un rendimiento promedio nacional de 23.2 predios inspeccionados por día-hombre, sobre 16,130 predios y 694.5 días-hombre. Colón (27.2), Coclé (25.0), Panamá Oeste (24.6), Los Santos (23.8) y Herrera (23.5) obtuvieron los mejores indicadores de productividad, superando el promedio nacional, mientras que Chiriquí (2,297) y Veraguas (1,866) concentraron la mayor carga operativa por el volumen de predios inspeccionados.

Acciones normativas: Como parte de las actividades de vigilancia y control sanitario, se formalizaron 23 compromisos de mejora y se emitieron 37 citaciones. Los compromisos de mejora se concentraron principalmente en Panamá Metro y Panamá Oeste (6 cada una) y Panamá Norte (4), mientras que Bocas del Toro registró el mayor número de citaciones (19), seguido de Chiriquí (7) y Guna Yala (5), reflejando el fortalecimiento de las acciones dirigidas a promover el cumplimiento de las medidas sanitarias para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores.



DENGUE	ZIKA	CHIKUNGUNYA	OROPOUCHE
4,936	1	4	18


DENGUE

Tabla V — Dengue por región

REGIÓN	ACUMULADO
Panamá Metro	1388
Colón	1067
Panamá Oeste	470
San Miguelito	411
Chiriquí	384
Bocas del Toro	365
Panamá Este	245
Panamá Norte	207
Herrera	148
Veraguas	81
Los Santos	60
Guna Yala	39
Coclé	33
C. Ngäbe Buglé	20
Darién	18
Total nacional	4936

Gráfico 1 — Casos confirmados por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



El **Dengue**, el **Zika** y el **Chikungunya** son transmitidos por el mosquito *Aedes aegypti* y se vigilan de forma conjunta mediante inspección domiciliaria, eliminación de criaderos y nebulización. El **Oropouche** se mantiene en seguimiento por su aparición reciente en el país. A la fecha se reportan 13 defunciones asociadas a Dengue grave.


Oropouche

Tabla VI — Oropouche por región

REGIÓN	CASOS
Herrera	4
Panamá Este	3
Panamá Metro	3
San Miguelito	2
Darién	2
C. Ngäbe Buglé	1
Coclé	1
Guna Yala	1
Panamá Oeste	1
Total general	18

Gráfico 2 — Casos confirmados por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



El **Oropouche** es una arbovirosis de aparición reciente en el país; se mantiene bajo seguimiento epidemiológico estrecho por su potencial de transmisión. La mayor afectación se concentra en **Panamá Este**, con casos aislados en Herrera, Comarca Ngäbe Buglé, San Miguelito y Darién.

Gráfico 3 — Casos confirmados de malaria por semana epidemiológica

Año 2026 (hasta la semana epidemiológica reportada) comparativo con el año 2025 completo.





Tabla VII — Indicadores acumulados por región endémica

Región	Diagnosticados en 48 h %	Tratados en 24 h %	Muestras de seguimiento	Casos confirmados con tratamiento finalizado %	Tasa de positividad %
C. Ngäbe Buglé	47.2%	93.3%	148	95.5%	1.5%
Guna Yala	68.0%	82.6%	402	51.2%	23.8%
Panamá Este	80.3%	92.5%	1,796	76.0%	30.0%
Veraguas	72.9%	18.8%	3	15.6%	68.8%
Darién	33.3%	97.0%	61	81.8%	2.1%

Mapa II — Distribución




ENFERMEDADES PARASITARIAS · MALARIA

02

Indicadores por región endémica

Tabla VIII — Clasificación de caso por región endémica



Datos utilizados por variable de Región de notificación

Tabla IX — Situación de casos por región endémica

REGIÓN	REGIÓN DE NOTIFICACIÓN			REGIÓN DE RESIDENCIA		
	CONFIRMADO	SOSPECHOSO	NEGATIVO	CONFIRMADO	SOSPECHOSO	NEGATIVO
Colón	0	0	0	0	0	0
Panamá Oeste	0	0	0	0	0	0
Chiriquí	0	0	0	0	0	0
San Miguelito	0	0	0	0	0	0
Panamá Metro	0	0	0	0	0	0
Bocas del Toro	4	1	72	4	6	99
Panamá Norte	0	0	0	0	0	0
Panamá Este	0	0	0	0	0	0
Herrera	10	0	1	9	0	3
Darién	0	0	0	0	0	0
Los Santos	2	0	4	3	0	6
Veraguas	32	1	1541	23	1	1133
Coclé	0	0	0	0	0	0
C. Ngäbe Buglé	0	0	0	0	0	0
Guna Yala	0	0	0	0	0	0
Región no registrada	0	0	0	18	28	1015

Datos utilizados por variable de Región de notificación

Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores. Regiones endémicas: Kuna Yala, Darién, Panamá Este, Comarca Ngäbe Buglé y Veraguas. Los indicadores en Malaria en algunas semanas epidemiológicas, y en algunas regiones, reportan “0”; esto se debe a que existe retraso en ingreso de la información al sistema de vigilancia epidemiológica. En las semanas subsiguientes estos datos serán actualizados.

ENFERMEDADES PARASITARIAS · MALARIA

02Casos y muestras por región

Tabla X — Casos nuevos y acumulados de malaria

REGIÓN DE SALUD	REGIÓN DE NOTIFICACIÓN		REGIÓN DE RESIDENCIA	
	SE 28	ACUMULADO	SE 28	ACUMULADO
Guna Yala	0	0	0	0
Panamá Este	0	0	0	0
Darién	0	0	0	0
Panamá Metro	0	0	0	0
C. Ngäbe Buglé	0	0	0	0
Veraguas	0	31	0	22
Panamá Oeste	0	0	0	0
Colón	0	0	0	0
San Miguelito	0	0	0	0
Chiriquí	0	0	0	0
Herrera	0	10	0	9
Bocas del Toro	0	4	0	4
Coclé	0	0	0	0
Los Santos	0	1	0	2
Panamá Norte	0	0	0	0
Región no registrada	0	0	0	18
Total	0	46	0	55

Tabla XI — Muestras por tipo de detección

REGIÓN DE SALUD	SE 28				ACUMULADO (SE 1-28)			
	REACTIVA	PASIVA	ACTIVA	SEGUIM.	REACTIVA	PASIVA	ACTIVA	SEGUIM.
Bocas del Toro	0	0	0	0	3	0	1	0
C. Ngäbe Buglé	3	0	3	0	31	23	33	10
Chiriquí	0	0	0	0	6	0	0	3
Colón	0	0	0	0	18	4	0	1
Darién	0	0	0	0	336	86	395	2
Herrera	0	0	0	0	10	0	0	0
Guna Yala	3	1	0	0	841	14	664	131
Los Santos	0	0	0	0	1	0	0	0
Panamá Este	2	0	0	0	766	143	909	1
Panamá Metro	0	0	0	0	75	4	34	4
Panamá Norte	0	0	0	0	4	0	0	1
Panamá Oeste	0	0	0	0	36	3	1	5
San Miguelito	0	0	0	0	16	1	0	0
Veraguas	0	0	0	0	16	0	15	0
Total	8	1	3	0	2,159	278	2,052	158

ENFERMEDADES PARASITARIAS · MALARIA

02 Notificadores y focos maláricos

Gráfico 4 — Muestreo por tipo de notificador

República de Panamá, distribución mensual acumulada año 2026.





Gráfico 5 — Tasa de positividad por región de salud según semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores. Regiones endémicas.

Focos con mayor número de casos

Mulatupu	1125 SE28:9	Ipetí Kuna	672 SE28:1	Akua Yala	497 SE28:2
Puerto Limón	529 SE28:0	Playón Chico	291 SE28:3	Puerto Obaldía	245 SE28:3
Fé-Metetí y Yaviza	68 SE28:2	Lajas Blancas	99 SE28:1	Comarca Wargandi	443 SE28:0
Cartí	72 SE28:1	Río Chiriquí	63 SE28:1	Jaqué	16 SE28:0
Santa Catalina	37 SE28:1	Tucutí	62 SE28:0	Unión Chocó	14 SE28:0
Río Concepción	6 SE28:0	Río Luis	12 SE28:0		

Datos utilizados por variable de Focos de residencia

Nota: Las actividades de control vectorial para Chagas no se ejecutan durante este periodo, debido a la priorización de otras acciones consideradas urgentes dentro del programa de salud pública. Se prevé retomar estas actividades en cuanto las condiciones operativas lo permitan, asegurando la continuidad de las acciones de prevención y control a mediano y largo plazo.

Tabla XIII — Vigilancia de Chagas

INDICADOR	CHIRIQUÍ	VERAGUAS	PANAMÁ OESTE	COCLÉ
Viviendas existentes	8	34	26	272
Viviendas inspeccionadas	6	32	26	272
Cobertura de inspección	0.75	0.94	1	1
Viviendas infestadas	0	0	0	0
Índice de infestación	0%	0	0	0
Control químico	No	No	0	0
Habitantes protegidos	46	86	87	563

Tabla XIV — Casos confirmados de Chagas

Panamá Oeste		7
Panamá Metro		5
Coclé		5
Panamá Este		3
Panamá Norte		3
Chiriquí		2
Veraguas		1
C. Ngäbe Buglé		1
Los Santos		1
Bocas del Toro		1
San Miguelito		1
Herrera		1
Total general		31

Durante el período evaluado se registra un acumulado nacional de 31 casos. La mayor concentración se observa en Panamá Oeste con 7 casos; en un segundo nivel, Panamá Metro y Coclé con 5 casos cada una. El comportamiento evidencia una distribución focalizada y una situación epidemiológica de baja incidencia.

Gráfico 6 — Casos confirmados de Chagas por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.




Tabla XV — Vigilancia de Leishmaniasis

INDICADOR	CHIRIQUÍ	PANAMÁ OESTE	VERAGUAS	COCLÉ
Predios inspeccionados	100	26	40	272
Predios con infestación	0	0	0	0
Índice de infestación	0	0 %	0	0
Casos recientes	0	0	0	0
Casos sospechosos	0	2	0	0
Control químico	0	0	40	272
Insecticida utilizado	0	0	0	4 litros

Tabla XVI — Casos confirmados de Leishmaniasis


Bocas del Toro		263
Panamá Oeste		207
C. Ngäbe Buglé		83
Veraguas		66
Coclé		56
Panamá Norte		55
Panamá Metro		47
Panamá Este		30
Colón		28
Chiriquí		28
San Miguelito		12
Los Santos		7
Darién		5
Total general		887

Durante el período evaluado se registra un acumulado nacional de 887 casos, evidenciando un incremento respecto al reporte previo. La mayor concentración se observa en Bocas del Toro (263), seguido de Panamá Oeste (207) y C. Ngäbe Buglé (83).

En un nivel intermedio se ubican Veraguas (66), Coclé (56) y Panamá Norte (55). Las menores frecuencias se registran en Panamá Metro (47), Panamá Este (30), Colón (28), Chiriquí (28), San Miguelito (12), Los Santos (7) y Darién (5).

Gráfico 7 — Casos confirmados de Leishmaniasis por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



Hantavirus — Vigilancia entomológica

Tabla XVII — Acciones de vigilancia entomológica para Hantavirus

REGIÓN	MANZ. TRAB.	PREDIOS INSP.	TRATADOS	FACTORES DE RIESGO							PRESENCIA DE ROEDORES		RODENTICIDA		TRAMPAS				ROED. CAPT.
				1	2	3	4	5	6	7	VIVOS	MUERTOS	F	P	Nº	S	DG	J	
TOTALES	247	5,748	166	1,562	1,711	844	716	590	1,263	1,469	9	2	2,600	8,455					0
Bocas del Toro																			0
Coclé	33	849	18	585	443	135	107	174	373	676	0	0	0	1,440					0
Colón																			0
Chiriquí	104	2,541	23	541	496	376	224	179	455	218	0	0	0	520					0
Darién																			0
Herrera	35	917	19	190	184	126	165	73	212	237	0	0	0	2,670					0
Los Santos	54	1,071	42	178	224	162	122	104	205	333	0	0	1,740	0					0
Panamá Metro																			0
Panamá Este	2	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0		860	0					0
Panamá Oeste	4	87	38	56	45	10	41	40	10	5	6	0	0	3,800					0
Panamá Norte																			0
San Miguelito	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	25					0
Veraguas	11	267	10	0	307	23	45	20	8	0	0	0	0	0					0
Guna Yala																			0
C. Ngäbe Buglé																			0

Fuente: Departamento de Control de Vectores. Las regiones sin registros no realizaron esta actividad durante la semana evaluada.

RODENTICIDA

F Fresco · P Parafinado

TIPO DE TRAMPA

S Sherman · DG De golpe o guillotina · J Jaula

FACTORES DE RIESGO

1 Granos dentro de la vivienda · 2 Cultivos y potreros a <30 m · 3 Patio sucio (maleza) · 4 Aguas servidas · 5 Chatarras · 6 Basura · 7 Otros

ANÁLISIS

A nivel nacional se intervinieron 247 manzanas y 5,748 predios inspeccionados, de los cuales 166 fueron tratados. Predominaron los factores de riesgo 2 (1,711) y 1 (1,562). La captura efectiva fue limitada: 9 roedores vivos y 2 muertos. Chiriquí (2,541 predios) y Los Santos (1,071) lideraron la carga operativa.

Hantavirus y Leptospirosis — Casos

Tabla XVIII — Casos confirmados de Hantavirus

REGIÓN	SCPH	FIEBRE
Los Santos	5	7
Herrera	4	2
Coclé	3	1
Veraguas	2	2
Total	14	12

Hasta la SE 28 se acumulan **26 casos confirmados de Hantavirus**: el **53.8% (n=14)** corresponde a Síndrome cardiopulmonar por hantavirus y el **46.2% (n=12)** a fiebre por hantavirus, con ligero predominio de la forma grave (SCPH). La mayor concentración se registra en **Los Santos (46.2%, n=12)**, seguida de **Herrera (23.1%, n=6)** y **Coclé (15.4%, n=4)**.

Tabla XIX — Casos confirmados de Leptospirosis

REGIÓN	CASOS
Colón	6
Chiriquí	6
C. Ngäbe Buglé	4
Bocas del Toro	3
Herrera	2
Coclé	2
Veraguas	2
Darién	1
Panamá Oeste	1
Panamá Metro	1
Total	28

Se acumulan 28 casos confirmados de leptospirosis a nivel nacional. La mayor afectación se observa en Colón y Chiriquí con 6 casos cada una; le sigue C. Ngäbe Buglé (4). En un nivel menor se registran Bocas del Toro (3), Herrera (2), Coclé (2), Veraguas (2), Darién (1), Panamá Oeste (1) y Panamá Metro (1). Comportamiento estable y acorde a un patrón endémico.

Gráfico 8 — Hantavirus por semana epidemiológica

Casos confirmados de SCPH y fiebre por hantavirus.





Gráfico 9 — Leptospirosis por semana epidemiológica

Casos confirmados a nivel nacional.



Equipo Nacional de Control de Vectores

Operativo de Control Vectorial ante Dengue en la Región Metropolitana de Salud

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

Operativo de Control Vectorial ante Dengue — En el marco de las acciones de respuesta ante la situación epidemiológica del dengue, durante la **Semana Epidemiológica N.º 28**, el equipo de **Control de Vectores** realizó apoyo y acompañamiento técnico a la **Región Metropolitana de Salud** durante el operativo desarrollado los días **16 y 17**, fortaleciendo las acciones de control y prevención dirigidas a la población.

Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la respuesta intersectorial y comunitaria para la **prevención y control del dengue**.

Recomendación: Fortalecer la participación comunitaria y la responsabilidad de la población en la prevención del dengue, promoviendo que los moradores identifiquen y eliminen de manera periódica los posibles criaderos del mosquito *Aedes aegypti* dentro y alrededor de sus viviendas. Estas acciones deben desarrollarse de manera articulada con las autoridades locales, reconociendo que la eliminación de criaderos es una responsabilidad que requiere la participación activa y sostenida de la comunidad.

Departamento de Control de Vectores — MINSA



Operativo de control vectorial contra el dengue — Región Metropolitana de Salud, 16 y 17 de julio.

⚠ SECCIÓN DE COMENTARIOS Y ALERTAS

Alerta Sanitaria por Malaria

RESOLUCIÓN N.º 020 DEL 24 DE ENERO DE 2023

Se decretó alerta sanitaria para el combate de la malaria, optimizando recursos para la vigilancia, monitoreo y control.

Alerta Sanitaria por Dengue

RESOLUCIÓN N.º 1580 DEL 25 DE JULIO DE 2024

Declara alerta sanitaria por dengue en las regiones de Panamá Metro, Colón, Panamá Oeste y Panamá Este, con énfasis focalizado en los corregimientos con mayor incidencia.

Crisis hídrica por contaminación del río La Villa y sus afluentes

RESOLUCIÓN N.º 56 DEL 10 DE JUNIO DE 2025

Declara el estado de emergencia en las provincias de Herrera y Los Santos y dicta otras disposiciones.

Estado de Emergencia en Bocas del Toro

RESOLUCIÓN N.º 48 DEL 27 DE MAYO DE 2025

Declara el estado de emergencia en la provincia de Bocas del Toro y dicta otras disposiciones.