

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES

Boletín Semanal

Semana Epidemiológica 27

05 al 11 de julio de 2026



El Boletín Semanal de Control de Vectores del MINSA es una publicación técnica que describe el comportamiento de la vigilancia entomológica y las acciones de prevención y control de vectores de importancia en salud pública, integrando indicadores entomológicos, criaderos y control físico, químico y biológico.

EN ESTA EDICIÓN

01 Arbovirosis — Dengue, Zika, Chikungunya, Oropouche

03 Otras — Hantavirus, Leptospirosis

02 Parasitarias — Malaria, Chagas, Leishmaniasis

04 Comentarios y alertas sanitarias

ARBOVIROSIS

01 Dengue · Zika · Chikungunya



43,739
CRIADEROS
INSPECCIONADOS

9,324
CRIADEROS
TRATADOS

17,217
CRIADEROS
ELIMINADOS

62,974^g
LARVICIDA ABATE

6,006
VIVIENDAS
NEBULIZADAS

1,123
MANZANAS
NEBULIZADAS

15,521
Predios
inspeccionados

3.0%
Índice
vivienda

3.5%
Índice
Breteau

1.3%
Índice
recipiente

Tabla I — Índices del *Aedes aegypti* por región



REGIÓN	VIVIENDA	BRETEAU	RECIP.
Bocas del Toro	● 1.6	1.8	0.5
Comarca Ngäbe Buglé	● 1.4	1.4	0.4
Coclé	● 0.2	0.2	0.1
Colón	● 3.0	3.0	1.9
Chiriquí	● 1.2	2.3	0.8
Darién	● 0.5	0.5	0.2
Herrera	● 3.6	3.6	3.5
Los Santos	● 0.3	0.3	0.3
Panamá Este	● 3.3	4.1	2.2
Panamá Metro	● 10.9	13.4	3.5
Panamá Oeste	● 2.4	2.4	0.7
Comarca Guna Yala	● 3.7	3.7	1.2
San Miguelito	● 6.4	7.7	1.5
Panamá Norte	● 4.6	4.8	1.3
Veraguas	● 0.9	0.9	0.8

● Bajo <1% ● Medio 1–<2% ● Alto ≥2%

Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores.


Mapa I — Índice de vivienda por región

Cada casilla muestra el índice de vivienda de la región (editable).



Del total de recipientes inspeccionados positivos, el 52% resultaron útiles para la proliferación del vector, mientras que el 46% fueron inservibles. De los recipientes útiles, el 66% resultaron positivos a la presencia de larvas.

Corregimientos con mayor riesgo de infestación



Prioridad: intervenir los corregimientos críticos, sostener el control en riesgo medio y mantener vigilancia en los <1%.

Vigilancia y control

Tabla II — Predios y rendimiento

REGIÓN	PREDIOS	DÍAS-H.	REND.
Bocas del Toro	489	20.3	24.1
C. Ngäbe Buglé	350	16	21.9
Coclé	893	38	23.5
Colón	822	69.9	11.8
Chiriquí	2,130	102.5	20.8
Darién	1,342	70	19.2
Herrera	1,014	45	22.5
Los Santos	878	32.8	26.8
Panamá Este	517	26	20
Panamá Metro	1,488	72.5	20.5
Panamá Oeste	1,189	54	22
Guna Yala	599	28	21.4
San Miguelito	1,242	76	16.3
Panamá Norte	567	27	21
Veraguas	2,001	91	22
Total	15,521	769	20.2

Tabla III — Control químico

REGIÓN	VIV. NEB.	MANZ. NEB.
Bocas del Toro	16	9
C. Ngäbe Buglé	0	0
Coclé	88	195
Colón	778	204
Chiriquí	774	274
Darién	138	0
Herrera	93	0
Los Santos	180	122
Panamá Este	168	0
Panamá Metro	1138	128
Panamá Oeste	948	54
Guna Yala	166	0
San Miguelito	954	77
Panamá Norte	565	60
Veraguas	166	0
TOTAL	6006	1123

Tabla IV — Componente normativo de las acciones de vigilancia entomológica

Se listan las regiones con actuaciones registradas en la semana.

REGIÓN	COMPROMISO DE MEJORA	CITACIONES
Bocas del Toro	13	20
C. Ngäbe Buglé	4	0
Coclé	1	1
Chiriquí	0	18
Panamá Metro	3	10
Panamá Oeste	4	2
Panamá Norte	6	0
Veraguas	3	3
Total	34	54

ANÁLISIS DE LA SEMANA

Rendimiento operativo: Durante la semana evaluada, los Técnicos en Control de Vectores registraron un rendimiento promedio nacional de 20,2 predios inspeccionados por día-hombre. Las regiones de Colón, Herrera, Comarca Ngäbe Buglé, Los Santos y Darién obtuvieron los mejores indicadores de productividad, superando el promedio nacional, mientras que Chiriquí y Panamá Metro concentraron la mayor carga operativa por el volumen de predios inspeccionados.

Acciones normativas: Como parte de las actividades de vigilancia y control sanitario, se formalizaron 34 compromisos de mejos y se emitieron 54 citaciones. Los compromisos de mejora se concentraron principalmente en la Comarca Ngäbe Buglé, Los Santos, Panamá Oeste y Panamá Norte, mientras que Panamá Metro registró el mayor número de citaciones (35), seguido de Chiriquí, Bocas del Toro y Los Santos, reflejando el fortalecimiento de las acciones dirigidas a promover el cumplimiento de las medidas sanitarias para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores



DENGUE

4,351

ZIKA

1

CHIKUNGUNYA

4

OROPOUCHE

16


DENGUE

Tabla V — Dengue por región

REGIÓN	ACUMULADO
Panamá Metro	1216
Colón	912
Panamá Oeste	411
San Miguelito	364
Bocas del Toro	349
Chiriquí	311
Panamá Este	234
Panamá Norte	176
Herrera	139
Veraguas	72
Los Santos	59
Guna Yala	39
Coclé	31
C. Ngäbe Buglé	19
Darién	18
Sin definir	1
Total nacional	4351

Gráfico 1 — Casos confirmados por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



El **Dengue**, el **Zika** y el **Chikungunya** son transmitidos por el mosquito *Aedes aegypti* y se vigilan de forma conjunta mediante inspección domiciliaria, eliminación de criaderos y nebulización. El **Oropouche** se mantiene en seguimiento por su aparición reciente en el país. A la fecha se reportan 13 defunciones asociadas a Dengue grave.


OROPOUCHE

Tabla VI — Oropouche por región

REGIÓN	CASOS
Herrera	4
Panamá Este	3
Coclé	2
Darién	2
C. Ngäbe Buglé	1
San Miguelito	1
Guna Yala	1
Panamá Oeste	1
Panamá Metro	1
Total general	16

Gráfico 2 — Casos confirmados por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



El **Oropouche** es una arbovirosis de aparición reciente en el país; se mantiene bajo seguimiento epidemiológico estrecho por su potencial de transmisión. La mayor afectación se concentra en **Panamá Este**, con casos aislados en Herrera, Comarca Ngäbe Buglé, San Miguelito y Darién.

Gráfico 3 — Casos confirmados de malaria por semana epidemiológica

Año 2026 (hasta la semana epidemiológica reportada) comparativo con el año 2025 completo.





Tabla VII — Indicadores acumulados por región endémica

Región	Diagnosticados en 48 h %	Tratados en 24 h %	Muestras de seguimiento	Casos confirmados con tratamiento finalizado %	Tasa de positividad %
C. Ngäbe Buglé	46.7%	92.2%	148	94.4%	1.5%
Guna Yala	80.5%	92.4%	1,797	76.0%	29.2%
Panamá Este	73.0%	18.6%	3	15.4%	68.9%
Veraguas	68.0%	82.5%	402	51.0%	23.7%
Darién	32.4%	97.1%	61	79.4%	2.1%

Mapa II — Distribución




ENFERMEDADES PARASITARIAS · MALARIA

02

Indicadores por región endémica

Tabla VIII — Clasificación de caso por región endémica



Datos utilizados por variable de Región de notificación

Tabla IX — Situación de casos por región endémica

REGIÓN	REGIÓN DE NOTIFICACIÓN			REGIÓN DE RESIDENCIA		
	CONFIRMADO	SOSPECHOSO	NEGATIVO	CONFIRMADO	SOSPECHOSO	NEGATIVO
Colón	o	0	0	0	0	0
Panamá Oeste	o	0	0	0	0	0
Chiriquí	o	0	0	0	0	0
San Miguelito	o	0	0	0	0	0
Panamá Metro	o	0	0	0	0	0
Bocas del Toro	4	1	71	4	5	99
Panamá Norte	o	0	0	0	0	0
Panamá Este	o	0	0	0	0	0
Herrera	10	0	1	9	0	3
Darién	o	0	0	0	0	0
Los Santos	2	0	4	3	0	6
Veraguas	32	1	1479	23	1	1073
Coclé	o	0	0	0	0	0
C. Ngäbe Buglé	o	0	0	0	0	0
Guna Yala	o	0	0	0	0	0
Región no registrada	o	0	0	19	29	977

Datos utilizados por variable de Región de notificación

Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores. Regiones endémicas: Kuna Yala, Darién, Panamá Este, Comarca Ngäbe Buglé y Veraguas. Los indicadores en Malaria en algunas semanas epidemiológicas, y en algunas regiones, reportan “o”; esto se debe a que existe retraso en ingreso de la información al sistema de vigilancia epidemiológica. En las semanas subsiguientes estos datos serán actualizados.

ENFERMEDADES PARASITARIAS · MALARIA

02 Casos y muestras por región

Tabla X — Casos nuevos y acumulados de malaria

REGIÓN DE SALUD	REGIÓN DE NOTIFICACIÓN		REGIÓN DE RESIDENCIA	
	SE 25	ACUMULADO	SE 25	ACUMULADO
Guna Yala	0	0	0	0
Panamá Este	0	0	0	0
Darién	0	0	0	0
Panamá Metro	0	0	0	0
C. Ngäbe Buglé	0	0	0	0
Veraguas	0	31	0	22
Panamá Oeste	0	0	0	0
Colón	0	0	0	0
San Miguelito	0	0	0	0
Chiriquí	0	0	0	0
Herrera	0	10	0	9
Bocas del Toro	0	4	0	4
Coclé	0	0	0	0
Los Santos	0	1	0	2
Panamá Norte	0	0	0	0
Región no registrada	0	0	0	19
Total	0	46	0	56

Tabla XI — Muestras por tipo de detección

REGIÓN DE SALUD	SE 25				ACUMULADO (SE 1-25)			
	REACTIVA	PASIVA	ACTIVA	SEGUIM.	REACTIVA	PASIVA	ACTIVA	SEGUIM.
Bocas del Toro	0	0	0	0	3	0	1	0
C. Ngäbe Buglé	0	0	0	0	26	21	31	9
Chiriquí	0	0	0	1	6	0	0	3
Colón	0	0	0	0	16	4	0	1
Darién	2	0	0	0	344	90	386	2
Herrera	0	0	0	0	10	0	0	0
Guna Yala	6	0	6	0	875	13	683	133
Los Santos	0	0	0	0	2	0	0	0
Panamá Este	0	0	1	0	789	147	930	1
Panamá Metro	0	0	2	0	76	3	34	4
Panamá Norte	0	0	0	0	4	0	0	1
Panamá Oeste	0	0	0	0	39	3	1	5
San Miguelito	0	0	0	0	17	1	0	0
Veraguas	0	0	0	0	17	0	15	0
Total	8	0	9	1	2,224	282	2,081	159

ENFERMEDADES PARASITARIAS · MALARIA

02 Notificadores y focos maláricos

Gráfico 4 — Muestreo por tipo de notificador

República de Panamá, distribución mensual acumulada año 2026.





Gráfico 5 — Tasa de positividad por región de salud según semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores. Regiones endémicas.

Focos con mayor número de casos

Mulatupu	1122 SE27:6	Ipetí Kuna	669 SE27:0	Akua Yala	490 SE27:1
Puerto Limón	529 SE27:0	Playón Chico	290 SE27:3	Puerto Obaldía	241 SE27:2
Fé-Metetí y Yaviza	67 SE27:1	Lajas Blancas	99 SE27:1	Comarca Wargandi	442 SE27:0
Cartí	72 SE27:1	Río Chiriquí	57 SE27:0	Jaqué	16 SE27:0
Santa Catalina	31 SE27:0	Tucutí	40 SE27:0	Unión Chocó	14 SE27:0
Río Concepción	6 SE27:0	Río Luis	12 SE27:0		

Datos utilizados por variable de Focos de residencia

Nota: Las actividades de control vectorial para Chagas no se ejecutan durante este periodo, debido a la priorización de otras acciones consideradas urgentes dentro del programa de salud pública. Se prevé retomar estas actividades en cuanto las condiciones operativas lo permitan, asegurando la continuidad de las acciones de prevención y control a mediano y largo plazo.

Tabla XIII — Vigilancia de Chagas

INDICADOR	VERAGUAS	CHIRIQUÍ
	Santa Fe - El Cuay	Renacimiento
Viviendas existentes	26	9
Viviendas inspeccionadas	26	6
Cobertura de inspección	1	0.66
Viviendas infestadas	0	0
Índice de infestación	0%	0
Control químico	0	0
Habitantes protegidos	58	40

Tabla XIV — Casos confirmados de Chagas

Panamá Oeste		6
Coclé		5
Panamá Metro		4
Panamá Este		3
Panamá Norte		3
Chiriquí		2
Veraguas		1
C. Ngäbe Buglé		1
Los Santos		1
Bocas del Toro		1
San Miguelito		1
Herrera		1
Total general		29

Durante el período evaluado se registra un acumulado nacional de 29 casos. La mayor concentración se observa en PANAMA OESTE con 6 casos; en un segundo nivel, COCLE y PANAMA METRO con 5 casos cada una. El comportamiento evidencia una distribución focalizada y una situación epidemiológica de baja incidencia.

Gráfico 6 — Casos confirmados de Chagas por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.




Tabla XV — Vigilancia de Leishmaniasis

INDICADOR	CHIRIQUÍ	PANAMÁ NORTE	VERAGUAS
Predios inspeccionados	75	21	26
Predios con infestación	0	0	0
Índice de infestación	0	0	0 %
Casos recientes	0	0	0
Casos sospechosos	0	0	0
Casos actuales	0	1	0
Control químico	0	21	0
Insecticida utilizado	0	1 litro	0
Habitantes investigados	142	44	58

Tabla XVI — Casos confirmados de Leishmaniasis


Bocas del Toro		252
Panamá Oeste		204
C. Ngäbe Buglé		79
Veraguas		66
Coclé		54
Panamá Norte		54
Panamá Metro		44
Panamá Este		30
Colón		28
Chiriquí		27
San Miguelito		12
Los Santos		7
Darién		5
Total general		862

Durante el período evaluado se registra un acumulado nacional de 862 casos, evidenciando un incremento respecto al reporte previo. La mayor concentración se observa en Bocas del Toro (252), seguido de PANAMA OESTE (204) y C. NGOBE BUGLE (79).

En un nivel intermedio se ubican Veraguas (66), COCLE (54) y PANAMA NORTE (54). Las menores frecuencias se registran en PANAMA METRO (44), PANAMA ESTE (30), COLON (28), CHIRIQUI (27), SAN MIGUELITO (12), Los Santos (7) y DARIEN (5).

Gráfico 7 — Casos confirmados de Leishmaniasis por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



Hantavirus — Vigilancia entomológica

Tabla XVII — Acciones de vigilancia entomológica para Hantavirus

REGIÓN	MANZ. TRAB.	PREDIOS INSP.	TRATADOS	FACTORES DE RIESGO							PRESENCIA DE ROEDORES		RODENTICIDA		TRAMPAS				ROED. CAPT.
				1	2	3	4	5	6	7	VIVOS	MUERTOS	F	P	Nº	S	DG	J	
TOTALES	273	5,549	176	1,465	1,586	704	641	503	1,174	1,593	9	8	3,740	6,691	120	120			
Bocas del Toro																			
Coclé	36	893	39	653	559	135	126	171	356	774				3,120					
Colón	1	41	41			20	20	20	20	20		5		5					
Chiriquí	127	2,667	25	424	468	268	144	135	370	121	3		320	326					
Darién																			
Herrera	34	1,014	6	218	317	135	231	71	222	288				720				7	
Los Santos	61	878	30	145	209	110	105	89	184	387			1,900		120	120			
Panamá Metro	5	5	5			2			4	1		2		1,520					
Panamá Este	4	20	20	21	21	21					6	1	1,520						
Panamá Oeste																			
Panamá Norte	2	10	10			4	4	5	4	2				1,000					
San Miguelito																			
Veraguas	3	21		4	12	9	11	12	14										
Guna Yala																			
C. Ngäbe Buglé																			

Fuente: Departamento de Control de Vectores. Las regiones sin registros no realizaron esta actividad durante la semana evaluada.

RODENTICIDA

F Fresco · P Parafinado

TIPO DE TRAMPA

S Sherman · DG De golpe o guillotina · J Jaula

FACTORES DE RIESGO

1 Granos dentro de la vivienda · 2 Cultivos y potreros a <30 m · 3 Patio sucio (maleza) · 4 Aguas servidas · 5 Chatarras · 6 Basura · 7 Otros

ANÁLISIS

A nivel nacional se intervinieron 273 manzanas y 5.549 predios inspeccionados, de los cuales 176 fueron tratados. Predominaron los factores de riesgo 1 (1.465) y 2 (1.586). La captura efectiva fue limitada: 9 roedores vivos y 8 muertos. y lideraron la carga operativa.

Hantavirus y Leptospirosis — Casos

Tabla XVIII — Casos confirmados de Hantavirus

REGIÓN	SCPH	FIEBRE
Los Santos	5	7
Herrera	4	2
Coclé	2	1
Veraguas	2	0
Total	13	10

Hasta la SE 27 se acumulan **23 casos confirmados de Hantavirus**: el **56.5% (n=13)** corresponde a Síndrome cardiopulmonar por hantavirus y el **43.5% (n=10)** a fiebre por hantavirus, con ligero predominio de la forma grave (SCPH). La mayor concentración se registra en **Los Santos (52.2%, n=12)**, seguida de **Herrera (26.1%, n=6)** y **Coclé (13.0%, n=3)**.

Tabla XIX — Casos confirmados de Leptospirosis

REGIÓN	CASOS
Colón	6
C. Ngäbe Buglé	4
Chiriquí	4
Bocas del Toro	3
Coclé	3
Herrera	2
Veraguas	2
Darién	1
Panamá Oeste	1
Total	26

Se acumulan 26 casos confirmados de leptospirosis a nivel nacional. La mayor afectación se observa en COLON (6); le siguen C. NGOBE BUGLE y CHIRIQUI con 4 casos cada una. En un nivel menor se registran Bocas del Toro (3), COCLE (3), Herrera (2), Veraguas (2), DARIEN (1) y PANAMA OESTE (1). Comportamiento estable y acorde a un patrón endémico.

Gráfico 8 — Hantavirus por semana epidemiológica

Casos confirmados de SCPH y fiebre por hantavirus.





Gráfico 9 — Leptospirosis por semana epidemiológica

Casos confirmados a nivel nacional.



Equipo Nacional de Control de Vectores

Metetí, Darién fortalece la lucha contra la malaria mediante la Estrategia de Agentes Comunitarios

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

Metetí, Darién. Como parte de las acciones para avanzar hacia la eliminación de la malaria en Panamá, se realizó jornada de capacitación dirigida a agentes comunitarios en el marco de la estrategia **DTIR (Diagnóstico, Tratamiento, Investigación y Respuesta)**, fortaleciendo así la vigilancia comunitaria en los focos maláricos de la región de Darién.

La actividad tuvo como objetivo fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los agentes comunitarios para la detección temprana, notificación, seguimiento y control de casos de malaria, contribuyendo a la interrupción de la transmisión y al acercamiento de los servicios de salud a las comunidades más vulnerables.

La capacitación contó con la participación de **19 agentes comunitarios**, acompañados por **3 técnicos de Control de Vectores**, además del respaldo del equipo nacional integrado por la Dra. Carmen Pérez, jefa nacional de Control de Vectores; Miguel Navarro, representante del nivel nacional; Isabel Rodríguez, asistente técnica; y la Lic. Claret Martínez, educadora para la salud. Asimismo, se contó con el acompañamiento de representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes respaldan los esfuerzos para fortalecer la respuesta comunitaria frente a la malaria.

Uno de los aspectos más destacados fue la implementación de metodologías participativas mediante el análisis de casos hipotéticos en lenguaje sencillo y contextualizado, permitiendo que los participantes fortalecieran sus capacidades de análisis y toma de decisiones ante situaciones reales que podrían presentarse en sus comunidades.

Adicionalmente, se realizó la entrega oficial de kits de trabajo para los agentes comunitarios, se completó el registro de participantes para su futura asignación en microáreas prioritarias y se garantizó la participación mediante la provisión de apoyo logístico y viáticos de alimentación y otros.

Departamento de Control de Vectores — MINSA



Capacitación a agentes comunitarios en la estrategia DTIR — Metetí, Región de Salud de Darién.



SECCIÓN DE COMENTARIOS Y ALERTAS

Alerta Sanitaria por Malaria

RESOLUCIÓN N.º 020 DEL 24 DE ENERO DE 2023

Se decretó alerta sanitaria para el combate de la malaria, optimizando recursos para la vigilancia, monitoreo y control.

Alerta Sanitaria por Dengue

RESOLUCIÓN N.º 1580 DEL 25 DE JULIO DE 2024

Declara alerta sanitaria por dengue en las regiones de Panamá Metro, Colón, Panamá Oeste y Panamá Este, con énfasis focalizado en los corregimientos con mayor incidencia.

Crisis hídrica por contaminación del río La Villa y sus afluentes

RESOLUCIÓN N.º 56 DEL 10 DE JUNIO DE 2025

Declara el estado de emergencia en las provincias de Herrera y Los Santos y dicta otras disposiciones.

Estado de Emergencia en Bocas del Toro

RESOLUCIÓN N.º 48 DEL 27 DE MAYO DE 2025

Declara el estado de emergencia en la provincia de Bocas del Toro y dicta otras disposiciones.