


Elaborado por: Dra. Yadira de Moltó / Dra. Catherine Castillo
Revisado: Dr. Pablo González - Jefe del Departamento Nacional de Epidemiología

A través de la vigilancia del síndrome gripal (ETI), las neumonías y bronconeumonías, y la bronquiolitis, se monitorea clínicamente el comportamiento de los virus respiratorios circulantes en el país.

Para la semana epidemiológica 27 de 2026, la tasa de incidencia del síndrome gripal se calculó en 19.9 casos por 100,000 habitantes, situándose por debajo del umbral estacional y evidenciando una disminución en comparación con la semana previa. En el caso de las neumonías y bronconeumonías, la tasa de incidencia correspondiente a la misma semana fue de 9.6 casos por 100,000 habitantes, manteniéndose en el umbral estacional pero bajo la curva epidémica.

Síndrome Gripal (ETI) : Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana y año.

Período 2010 -2025. República de Panamá. 2026/p




*: Tasa por 100 000 habitantes

/p SE 27

Fuente: Departamento de Epidemiología

Neumonía y Bronconeumonía: Tasa* de incidencia, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año.

Período 2009 -2025. República de Panamá. 2026/p



*: Tasa por 100 000 habitantes


/p SE 27

Fuente: Departamento de Epidemiología

Por su parte, la bronquiolitis presentó una tasa de incidencia de 9.4 casos por 100,000 habitantes, disminuye la tasa respecto a la semana anterior. No obstante, este evento se ubica sobre el umbral estacional y de la curva epidémica.

Bronquiolitis: Tasa* de incidencia, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año.

Período 2009 -2025. República de Panamá. 2026/p



*: Tasa por 100 000 habitantes

/p SE 27

Fuente: Departamento de Epidemiología

Informe de COVID-19
SE 27


Para la semana epidemiológica 27 de 2026 se notificaron 29 casos confirmados de COVID-19, acumulándose 622 casos en lo que va del año. La positividad aumenta a 5.2% en comparación con la semana anterior. No se notifican defunciones para esta SE 27, por lo que el acumulado anual de defunciones por COVID-19 es de 08.

DATOS SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 27 (05 al 11 de Julio de 2026)	
Nuevos casos confirmados	29
Hospitalizados	10
Sala	8
UCI	2
Defunciones	2
Pruebas de laboratorio realizadas	559
Porcentaje de positividad	5.2%

/p SE 27

Fuente: Departamento de Epidemiología

Casos de COVID-19 según semana epidemiológica, en la República de Panamá, 2023-2026/p



/p SE 27

Fuente: Departamento de Epidemiología


Defunciones por COVID-19

En cuanto a las defunciones por SARS-CoV-2, el 62.5% eran adultos mayores de 60 años y los hombres representaban el 50%. El 100% de las defunciones no contaba con vacunación contra SARS-CoV-2 actualizada y 50% tenía 03 dosis cuya última vacunación fue en 2022, mientras que el 75.0% presentaba factores de riesgo, principalmente relacionados con edad avanzada y comorbilidades metabólicas, cardiovasculares y renales.

Desde el punto de vista geográfico, las defunciones se concentraron principalmente en las regiones de San Miguelito y Panamá Oeste

Tasa de mortalidad por COVID-19 por distrito en la República de Panamá


Agrupación por semana epidemiológica cada 5 semanas - 2026 / hasta SE 26



Defunciones por Influenza:

En la semana epidemiológica 27 de 2026 se notifica 01 defunción por influenza. El acumulado anual es de 56 defunciones.

Defunciones por influenza: Tasa* de mortalidad, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana y año. Período 2015 - 2019, 2022-2025. República de Panamá. 2026/p




/p SE 27

Fuente: Departamento de Epidemiología

Defunciones por influenza según características epidemiológicas

Defunciones por influenza según sexo y grupo de edad, en la República de Panamá, 2026
/p



/p SE 27

Fuente: Departamento de Epidemiología

Del total de 56 defunciones por influenza registradas en el año, el 57.1% correspondió a hombres.

La mayor proporción de defunciones se concentró en el grupo de 65 años y más (58.9%), seguido por los menores de 1 año (12.7%).


En cuanto a antecedentes, el 100% de las defunciones no contaba con vacunación contra influenza en la temporada actual y 82% tampoco estaba vacunado contra la temporada 2025, mientras que el 82% presentaba factores de riesgo, principalmente relacionados con edad avanzada y comorbilidades metabólicas, cardiovasculares y renales.

Respecto al agente identificado, la mayoría de las defunciones se asociaron a influenza A (70.3%), incluyendo subtipos H1N1pdm09 y H3N2, mientras que una menor proporción correspondió a influenza B.

Desde el punto de vista geográfico, las defunciones se han concentrado en las últimas semanas en la región de Panamá Oeste (23.2%), Panamá Metro (16.1%) y Chiriquí (12.5%).

Tasa de mortalidad por Influenza por distrito en la República de Panamá

Agrupación por semana epidemiológica cada 5 semanas - 2026/pSE 27



Fuente: Departamento de Epidemiología


Vigilancia laboratorial de Virus respiratorios
SE 27 2026

En la semana epidemiológica 27 de 2026 se identificó circulación de diversos virus respiratorios, incluyendo VSR, influenza, rinovirus, parainfluenza y SARS-CoV-2. La influenza con una positividad del 26.4% se ubica por debajo de la curva epidémica y sobre el umbral estacional.

El VSR presentó una positividad de 31.9%, siendo el virus detectado con mayor frecuencia, situándose por encima de la curva epidémica, pero bajo el umbral de alerta.


Por su parte, la positividad de SARS-CoV-2 fue de 5.2%, manteniéndose por debajo del umbral estacional y de la curva epidémica. El Metaneumovirus presenta una positividad de 6% sobre la curva epidémica y del umbral estacional.

Número de muestras positivas por virus respiratorios, vigilancia centinela de la República de Panamá, 2026/p




Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet

Porcentaje de positividad de Influenza, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año. Periodo 2015 - 2025. República de Panamá. 2026/p.




/p SE 27
Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet

Porcentaje de positividad de Virus Sincial Respiratorio, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año. Periodo 2013-2019 y 2024. República de Panamá. 2026/p.



/p SE 27
Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet


Porcentaje de positividad de SARS-CoV-2, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año. Periodo 2020-2025. República de Panamá. 2026/p.



/p SE 27
Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet

Porcentaje de positividad de Metaneumovirus curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año.

Periodo 2012-2019 y 2021-2025. República de Panamá. 2026/p. -



/p SE 27
Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet

Muestras positivas a virus respiratorios en sitios centinelas de Panamá, según semana epidemiológica. 2026p

Año	SE	Positivo Influenza A				Positivo Influenza B			Positivo VRS			Positivo SARS-CoV-2	Positivo otros virus respiratorios*						
		A(H1N1)pdm09	A no subtipificado	A no subtipificable	A(H3N2)	B Victoria	B Yamagata	B linaje no determinado	VRS no tipificado	VRS A	VRS B		Parainfluenza	Adenovirus	Metapneumovirus	Rinovirus	Coronavirus	Bocavirus	Otros
YEAR	EW	FLU_H1N1	FLU_ANOSU	FLU_ANOSA	FLU_AH3	FLU_BVIC	FLU_BYAM	FLU_BNOT	RSV_NP	RSV_A	RSV_B	SC2	ORV_PARAINF	ORV_ADENO	ORV_METAPNEU	ORV_RHINO	ORV_CORONA	ORV_BOCA	ORV_OTHER
2025	1	51	2	0	28	1	0	0	31	12	13	11	0	2	5	20	0	9	0
2025	2	25	11	0	28	1	0	0	33	22	15	8	2	0	3	26	2	2	0
2025	3	14	15	0	12	1	0	0	17	12	5	6	0	5	6	26	1	1	0
2025	4	10	13	0	15	0	0	0	24	14	1	4	0	5	1	22	0	5	0
2025	5	2	2	0	2	0	0	0	2	13	4	0	2	0	2	7	0	1	1
2025	6	1	5	0	9	0	0	0	0	0	1	0	4	0	2	7	1	0	0
2025	7	4	2	0	7	0	0	0	0	5	2	2	2	0	1	4	1	1	0
2025	8	9	4	0	13	0	0	0	0	4	1	4	1	1	1	8	0	0	0
2025	9	3	8	0	18	0	0	1	1	1	1	2	2	0	0	13	0	1	0
2025	10	3	4	0	11	0	0	0	0	3	0	3	1	1	0	11	0	2	0
2025	11	2	2	0	12	0	0	0	0	2	0	4	0	3	0	10	2	0	0
2025	12	1	3	0	15	0	0	0	0	1	2	6	1	2	1	21	0	0	0
2025	13	0	3	0	14	0	0	0	0	2	1	5	0	0	0	12	1	0	0
2025	14	0	1	0	12	0	0	1	1	5	0	2	1	1	0	13	2	1	1
2025	15	0	0	0	5	0	0	0	0	2	3	1	1	1	0	11	0	0	0
2025	16	0	3	0	7	0	0	1	0	5	0	3	3	0	0	13	1	1	1
2025	17	0	1	0	11	0	0	0	0	7	0	1	1	3	0	9	2	1	0
2025	18	0	5	0	17	1	0	0	0	13	2	5	2	1	1	13	1	3	0
2025	19	1	3	0	23	0	0	0	0	10	3	1	7	1	0	11	0	0	1
2025	20	0	5	0	19	1	0	0	2	7	9	1	5	3	2	13	2	0	1
2025	21	0	2	0	35	2	0	0	0	15	7	4	4	2	0	14	0	0	1
2025	22	0	4	0	28	0	0	0	2	13	3	5	6	1	0	13	0	1	0
2025	23	0	1	0	18	1	0	0	1	9	2	5	1	4	2	5	2	1	0
2025	24	0	1	0	13	0	0	0	0	13	4	3	4	4	1	7	3	1	0
2025	25	0	4	0	17	2	0	0	1	20	7	1	2	3	0	15	1	0	0
2025	26	1	0	0	35	2	0	0	0	19	10	7	6	1	1	8	0	0	0
2025	27	0	0	0	18	1	0	0	0	17	6	2	1	1	1	3	0	0	0
2025	28																		
2025	29																		
2025	30																		
2025	31																		
2025	32																		
2025	33																		
2025	34																		
2025	35																		
2025	36																		
2025	37																		
2025	38																		
2025	39																		
2025	40																		
2025	41																		
2025	42																		
2025	43																		
2025	44																		
2025	45																		
2025	46																		
2025	47																		
2025	48																		
2025	49																		
2025	50																		
2025	51																		
2025	52																		
2025	53																		

/p SE 27

Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet