


Elaborado por: Dra. Yadira de Moltó / Dra. Catherine Castillo
Revisado: Dr. Pablo González - Jefe del Departamento Nacional de Epidemiología

A través de la vigilancia del síndrome gripal (ETI), las neumonías y bronconeumonías, y la bronquiolitis, se monitorea clínicamente el comportamiento de los virus respiratorios circulantes en el país.

Para la semana epidemiológica 28 de 2026, la tasa de incidencia del síndrome gripal se calculó en 17.1 casos por 100,000 habitantes, situándose por debajo del umbral estacional y evidenciando una disminución en comparación con la semana previa. En el caso de las neumonías y bronconeumonías, la tasa de incidencia correspondiente a la misma semana fue de 10.6 casos por 100,000 habitantes, manteniéndose en el umbral estacional y sobre la curva epidémica.

Síndrome Gripal (ETI) : Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana y año.
Período 2010 -2025. República de Panamá. 2026/p




*: Tasa por 100 000 habitantes

/p SE 28

Fuente: Departamento de Epidemiología

Neumonía y Bronconeumonía: Tasa* de incidencia, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año.
Período 2009 -2025. República de Panamá. 2026/p




*: Tasa por 100 000 habitantes

/p SE 28

Fuente: Departamento de Epidemiología

Por su parte, la bronquiolitis presentó una tasa de incidencia de 10.6 casos por 100,000 habitantes, la cual aumenta levemente con respecto a la semana anterior. No obstante, este evento se ubica sobre el umbral estacional y de la curva epidémica.

Bronquiolitis: Tasa* de incidencia, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año.
Período 2009 -2025. República de Panamá. 2026/p



*: Tasa por 100 000 habitantes

/p SE 28

Fuente: Departamento de Epidemiología

Informe de COVID-19
SE 28


Para la semana epidemiológica 28 de 2026 se notificaron 28 casos confirmados de COVID-19, acumulándose 782 casos en lo que va del año. La positividad disminuye a 3.6% en comparación con la semana anterior. Se notifica 1 defunción para esta SE 28 y se actualizan 2 defunciones (SE 12 y 13) por lo que el acumulado anual de defunciones por COVID-19 es de 11.

DATOS SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 28 (12 al 18 de Julio de 2026)	
Nuevos casos confirmados	28
Hospitalizados	24
Sala	22
UCI	2
Defunciones	0
Pruebas de laboratorio realizadas	782
Porcentaje de positividad	3.6%

/p SE 28

Fuente: Departamento de Epidemiología

Casos de COVID-19 según semana epidemiológica, en la República de Panamá, 2023-2026/p



/p SE 28

Fuente: Departamento de Epidemiología


Defunciones por COVID-19

En cuanto a las defunciones por SARS-CoV-2, el 44% eran adultos mayores de 80 años y los hombres representaban el 55.6%. El 100% de las defunciones no contaba con vacunación contra SARS-CoV-2 actualizada y 50% tenía 03 dosis cuya última vacunación fue en 2022, mientras que el 75.0% presentaba factores de riesgo, principalmente relacionados con edad avanzada y comorbilidades metabólicas, cardiovasculares y renales.

Desde el punto de vista geográfico, las defunciones se concentraron principalmente en las regiones de San Miguelito y Panamá Oeste

Tasa de mortalidad por COVID-19 por distrito en la República de Panamá

Agrupación por semana epidemiológica cada 5 semanas - 2026 / hasta SE 28




Fuente: Departamento de Epidemiología

Defunciones por Influenza:

En la semana epidemiológica 28 de 2026 se notifica 01 defunción por influenza y se actualiza 01 defunción de SE 24. El acumulado anual es de 58 defunciones.

Defunciones por influenza: Tasa* de mortalidad, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana y año. Período 2015 - 2019, 2022-2025. República de Panamá. 2026/p




/p SE 28

Fuente: Departamento de Epidemiología

Defunciones por influenza según características epidemiológicas

Defunciones por influenza según sexo y grupo de edad, en la República de Panamá, 2026
/p



/p SE 28

Fuente: Departamento de Epidemiología

Del total de 58 defunciones por influenza registradas en el año, el 56.9% correspondió a hombres.

La mayor proporción de defunciones se concentró en el grupo de 65 años y más (60.3%), seguido por los menores de 1 año (11.1%).


En cuanto a antecedentes, el 100% de las defunciones no contaba con vacunación contra influenza en la temporada actual y 82% tampoco estaba vacunado contra la temporada 2025, mientras que el 82.8 % presentaba factores de riesgo, principalmente relacionados con edad avanzada y comorbilidades metabólicas, cardiovasculares y renales.

Respecto al agente identificado, la mayoría de las defunciones se asociaron a influenza A (72.4%), incluyendo subtipos H1N1pdm09 y H3N2, mientras que una menor proporción correspondió a influenza B.

Desde el punto de vista geográfico, las defunciones se han concentrado en las últimas semanas en la región de Panamá Oeste (22.4%), Panamá Metro (17.2%) y Chiriquí (12.1%).

Tasa de mortalidad por Influenza por distrito en la República de Panamá

Agrupación por semana epidemiológica cada 5 semanas - 2026/pSE 28




Fuente: Departamento de Epidemiología

Defunciones por Virus Sincitial:


En la semana epidemiológica 28 de 2026 se notifica 01 defunción por vsr. El acumulado anual es de 13 defunciones. En cuanto al comportamiento temporal, nueve de las 13 defunciones (69,2 %) se registraron entre las semanas epidemiológicas 23 y 28. La mayor frecuencia se observó en la SE 27, con tres defunciones. Actualmente se ubica sobre el umbral de alerta.

Defunciones por Virus Sincitial Respiratorio: Tasa* de mortalidad, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana y año. Período 2015 -2025. República de Panamá. 2026/p



SE 28
Fuente: Departamento de Epidemiología

Defunciones por Virus Sincitial respiratorio según sexo y grupo de edad, en la República de Panamá, 2026 /p



Doce de las defunciones (92,3 %) ocurrieron en menores de 5 años. 2 defunciones (15,4 %) ocurrieron en menores de 6 meses.


La mediana de edad fue aproximadamente de 12 meses, con un rango entre 42 días y 85 años.

Según sexo, ocho defunciones correspondieron a hombres (61,5 %) y cinco a mujeres (38,5 %). Entre los menores de 5 años, el 66,7 % correspondió hombres.

SE 28
Fuente: Departamento de Epidemiología

Tasa de mortalidad por VRS por distrito en la República de Panamá

Bloques de cinco semanas epidemiológicas, 2026/pSE 28



La comarca Ngäbe-Buglé concentró la mayoría de las defunciones (30,8 %), seguido de Bocas del Toro y Chiriquí (23,1 % respectivamente), Coclé, Panamá Metro y Panamá Oeste (7,7 % respectivamente).

Fuente: Departamento de Epidemiología. Datos preliminares sujetos a actualización.


Vigilancia laboratorial de Virus respiratorios
SE 28 2026

En la semana epidemiológica 28 de 2026 se identificó circulación de diversos virus respiratorios, incluyendo VSR, influenza, rinovirus, parainfluenza y SARS-CoV-2. La influenza con una positividad del 23.5% se ubica por debajo de la curva epidémica y sobre el umbral estacional.

El VSR presentó una positividad de 38.2%, siendo el virus detectado con mayor frecuencia, situándose por encima de la curva epidémica, pero bajo el umbral de alerta.


Por su parte, la positividad de SARS-CoV-2 fue de 3.6%, manteniéndose por debajo del umbral estacional y de la curva epidémica. El Metaneumovirus presenta una positividad de 12% sobre la curva epidémica y del umbral estacional.

Número de muestras positivas por virus respiratorios, vigilancia centinela de la República de Panamá, 2026/p



Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet


Porcentaje de positividad de Influenza, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año.
Periodo 2015 - 2025. República de Panamá. 2026/p.



/p SE 28

Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet


Porcentaje de positividad de Virus Sincitial Respiratorio, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año.
Periodo 2013-2019 y 2024. República de Panamá. 2026/p.



/p SE 28

Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet


Porcentaje de positividad de SARS-CoV-2, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año.
Periodo 2020-2025. República de Panamá. 2026/p.



/p SE 28

Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet

Porcentaje de positividad de Metaneumovirus curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año.
Periodo 2012-2019 y 2021-2025. República de Panamá. 2026/p. -



/p SE 28

Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet

Muestras positivas a virus respiratorios en sitios centinelas de Panamá, según semana epidemiológica. 2026p

Año	SE	Positivo Influenza A				Positivo Influenza B			Positivo VRS			Positivo SARS-CoV-2	Positivo otros virus respiratorios*						
		A(H1N1)pdm09	A no subtipificado	A no subtipificable	A(H3N2)	B Victoria	B Yamagata	B linaje no determinado	VRS no tipificado	VRS A	VRS B		Parainfluenza	Adenovirus	Metapneumovirus	Rinovirus	Coronavirus	Bocavirus	Otros
YEAR	EW	FLU_H1N1	FLU_ANOSU	FLU_ANOSA	FLU_AH3	FLU_BVIC	FLU_BYAM	FLU_BNDT	RSV_NP	RSV_A	RSV_B	SC2	ORV_PARAINF	ORV_ADENO	ORV_METAPNEU	ORV_RHINO	ORV_CORONA	ORV_BOCA	ORV_OTHER
2026	1	51	2	0	28	1	0	0	31	12	13	11	0	2	5	20	0	9	0
2026	2	25	11	0	28	1	0	0	33	22	15	8	2	0	3	26	2	2	0
2026	3	14	15	0	12	1	0	0	17	12	5	5	6	0	5	26	1	1	0
2026	4	10	13	0	15	0	0	0	24	14	1	4	0	5	1	22	0	5	0
2026	5	2	2	0	2	0	0	0	2	13	4	0	2	0	2	7	0	1	1
2026	6	1	5	0	9	0	0	0	0	0	1	0	4	0	2	7	1	0	0
2026	7	4	2	0	7	0	0	0	0	5	2	2	2	0	1	4	1	1	0
2026	8	9	4	0	13	0	0	0	0	4	1	4	1	1	1	8	0	0	0
2026	9	3	8	0	18	0	0	1	1	1	1	2	2	0	0	13	0	1	0
2026	10	3	4	0	11	0	0	0	0	3	0	3	1	1	0	11	0	2	0
2026	11	2	2	0	12	0	0	0	0	2	0	4	0	3	0	10	2	0	0
2026	12	1	3	0	15	0	0	0	0	1	2	6	1	2	1	21	0	0	0
2026	13	0	3	0	14	0	0	0	0	2	1	5	0	0	0	12	1	0	0
2026	14	0	1	0	12	0	0	1	1	5	0	2	1	1	0	13	2	1	1
2026	15	0	0	0	5	0	0	0	0	2	3	1	1	1	0	11	0	0	0
2026	16	0	3	0	7	0	0	1	0	5	0	3	3	0	0	13	1	1	1
2026	17	0	1	0	11	0	0	0	0	7	0	1	1	3	0	9	2	1	0
2026	18	0	5	0	17	1	0	0	0	13	2	5	2	1	1	13	1	3	0
2026	19	1	3	0	23	0	0	0	0	10	3	1	7	1	0	11	0	0	1
2026	20	0	5	0	19	1	0	0	2	7	9	1	5	3	2	13	2	0	1
2026	21	0	2	0	35	2	0	0	0	15	7	4	4	2	0	14	0	0	1
2026	22	0	4	0	28	0	0	0	2	13	3	5	6	1	0	13	0	1	0
2026	23	0	1	0	18	1	0	0	1	9	2	5	1	4	2	5	2	1	0
2026	24	0	1	0	13	0	0	0	0	13	4	3	4	4	1	7	3	1	0
2026	25	0	4	0	17	2	0	0	1	20	7	1	2	3	0	15	1	0	0
2026	26	1	0	0	39	2	0	0	0	19	10	8	7	2	1	13	1	0	0
2026	27	0	2	0	19	1	0	0	1	23	7	2	4	1	2	10	0	0	0
2026	28	0	0	0	13	3	0	0	0	19	7	1	0	0	2	3	0	0	0
2026	29																		
2026	30																		
2026	31																		
2026	32																		
2026	33																		
2026	34																		
2026	35																		
2026	36																		
2026	37																		
2026	38																		
2026	39																		
2026	40																		
2026	41																		
2026	42																		
2026	43																		
2026	44																		
2026	45																		
2026	46																		
2026	47																		
2026	48																		
2026	49																		
2026	50																		
2026	51																		
2026	52																		
2026	53																		

/p SE 28

Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet