

DOLUTEGRAVIR/LAMIVUDINA/TENOFOVIR

¿Qué es DLT?

Es una nueva opción de tratamiento para las personas que viven con VIH, recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Dolutegravir (50mg)
+ Lamivudina (300mg)
+ Tenofovir DF (300mg)

¿POR QUÉ MI MÉDICO ME RECETÓ DLT?

El DLT ofrece muchos beneficios, incluyendo una supresión viral más rápida (disminución del virus presente en el cuerpo), efectos secundarios mínimos y es más difícil para el virus desarrollar resistencia a los medicamentos.

USO EN EMBARAZADAS

Este medicamento no debe ser utilizado en el primer trimestre de embarazo, por lo que si eres una mujer entre 15 y 49 años debes utilizar métodos anticonceptivos o de barrera mientras tomas DLT. Si quedas embarazada mientras tomas DLT contacta a tu médico de inmediato.

¿CUÁNDO Y CÓMO DEBO TOMAR DLT?

DEBE TOMARSE 1 TABLETA DIARIAMENTE POR VÍA ORAL CON O SIN COMIDA

No dejes de tomar tu medicamento aunque te sientas bien, si olvidas una dosis o dejas de tomar DLT tu condición puede empeorar y volverse más difícil de tratar.

INTERACCIONES

EL DLT PUEDE INTERACTUAR CON OTROS MEDICAMENTOS

como antiácidos, algunas multivitaminas, suplementos de hierro, medicamentos para la tuberculosis, la epilepsia y para la diabetes.

Si estás tomando éstos u otros medicamentos, consulta a tu médico para obtener más información

¿CUÁLES SON ALGUNOS DE LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DEL TLD?

• DIFICULTAD PARA CONCILIAR EL SUEÑO • DOLOR DE CABEZA • GASES (FLATULENCIA) • DIARREA • AUMENTO DE PESO • NÁUSEAS O MAREO OCASIONAL • DAÑOS EN EL HÍGADO (ESPECIALMENTE SI TIENE ANTECEDENTE DE HEPATITIS VIRALES

RECUERDA

HABLA CON TU MÉDICO SI TIENES ALGÚN PROBLEMA.

Almacena el medicamento a temperatura ambiente
Guárdalo alejado de la luz directa del sol
Debes mantener el DLT en su frasco original con la tapa bien cerrada.
Mantente en contacto con tu clínica