


Comportamiento histórico de la tos ferina

Casos y tasa de incidencia de tos ferina. 1978 - 2014



Tos ferina: Casos y mediana actual y acumulada, cálculo especial, según semana epidemiológica. 2015/p

Semana Epidemiológica	Casos notificados				Mediana 2010 - 2014		Cálculo Especial (1)
	2014		2015		Sem.	Sem.	
	A	AC	A	AC	A	AC	
15	1	9	0	4	2	15	1.4
14	0	8	0	4	3	15	1.4
13	2	8	0	4	0.5	13	1.6
12	1	6	1	4	1	12	1.5
11	0	5	0	3	2	11	1.2
10	2	5	1	3	1	11	1.4
09	0	3	0	2	2	9	1.6
08	0	3	0	2	1	8	1.6
07	0	3	1	2	1	6	1.7
06	0	3	1	1	2.5	5	1.7
05	0	3	0	0	2.5	5	1.7
04	1	3	0	0	0.5	2	1.6
03	0	2	0	0	2	2	1.6
02	2	2	0	0	1	1	1
01	0	0	0	0	1	1	1


A: Actual, AC: Acumulados

(1) Índice epidémico: Es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata de I.E. acumulado) y los casos que se esperan o preveen (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24 la incidencia se considera normal, si es menor o igual a 0,75 incidencia baja, si es mayor o igual a 1,25 incidencia alta.

Cálculo especial: En enfermedades de baja incidencia (<150 casos anuales) no se usa el índice epidémico. El cálculo especial para estas enfermedades es el promedio de los casos notificados en los 5 años anteriores en la semana actual, las 2 semanas precedentes y las dos siguientes.

Corredor Endémico para Tos ferina . 2015.

Panamá, Periodo 2008 a 2014



Fuente: Departamento de Epidemiología. MINSA

Casos de Tos ferina, según grupo de edad y región de salud. Panamá. 2015/p

GRUPO DE EDAD	REGIÓN				REPÚBLICA	
	CHIRIQUÍ		SAN MIGUELITO			
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
<1 AÑO	0	0	1	17.84	1	1.34
1- 4 AÑOS	3	8.67	0	0.00	3	1.01
TOTAL	3	0.66	1	0.28	4	0.10

En las regiones de salud de Bocas del Toro, Coclé, Colón, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Este, Panamá Oeste, Panamá Metro, Veraguas, Kuna Yala y Ngabe Buglé no se han identificado casos hasta la semana 15.

Fuente: Departamento de Epidemiología


Antecedentes de vacunación de casos de Tos ferina, según grupo de edad. Panamá 2015/p

GRUPO DE EDAD	CASOS DE TOS FERINA	DOSIS DE VACUNA ANTI PERTUSSICA					
		NO VACUNADO	1DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS	DESCONOCIDO
< 1 AÑO							
<3MESES							
3 A 6MESES							
7 A 11 MESES	1	1					
1-4 AÑOS	3				2	1	
5 -9 AÑOS							
10-14 AÑOS							
35- 39 AÑOS							
45-49 AÑOS							
55 -59 AÑOS							
TOTAL	4	1			2	1	

Esquema de Vacunación : Hexavalente (DPaT, Hib,HepB,IPV) 2-4-6 meses, **Tetavalente** (DPwT-Hib) 18 meses, **DPwT** 4 años, **Tdap** - 10 años . **Tdap** A todas las Embarazadas en cada embarazo a partir del 3er Trimestre, a su pareja y a los cuidadores del recién nacido; si no recibió la dosis en el embarazo, se debe aplicar en el puerperio inmediato. Funcionarios de Salud y ante la sospecha de un caso de Tos ferina durante la investigación del mismo.

Fuente: Departamento de Epidemiología

Casos de Tos ferina, según corregimiento. República de Panamá. 2015 /p



En Panamá, en el año 2015, se han confirmado 4 casos de **Tos ferina** en 2 regiones de salud: San Miguelito y Chiriquí. A su vez están distribuidos en 3 distritos, de los cuales 1 caso pertenece al Distrito de San Miguelito (Corregimiento Belisario Porras) y 2 casos pertenecen al Distrito de David (Corregimiento de *David*) y 1 caso al Distrito de Boquerón (Corregimiento de Tijeras).

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSA.