



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE SALUD-DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO #4


Semana: No. 23

25 de Junio de 2015

Editoras: Dra. Yadira de Moltó / Licda. Adriana García /Dra. Lourdes García


Comportamiento histórico de la tos ferina

Casos y tasa de incidencia de tos ferina. 1978 - 2014




Nota:
 *.tasa por 100 000 habitantes
 Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica MINSA-CSS


En 2014 se evaluaron 338 casos sospechosos de tos ferina y hasta la semana 23 de 2015 se han evaluado 73 casos, distribuidos por semana epidemiológica según se observa en la siguiente gráfica.



De los 73 casos sospechosos evaluados en **2015** hasta la semana epidemiológica 23 se han confirmado 4 casos de tos ferina y 69 casos han sido clasificados como de síndrome coqueluchoide (negativos a *Bordetella pertussis*). Todos por laboratorio. Ver la siguiente gráfica.



Como se observa en corredor endémico siguiente, hemos estado durante el año 2015 en zona de seguridad y éxito hasta la semana epidemiológica 23.



Comparado con el 2014 se observa reducción importante de casos de tosferina acumulados a la semana 23 de 2015, 4 casos, mientras que en 2014 a la misma semana se notificaron 15. Ver tabla siguiente.

Tos ferina: Casos y mediana actual y acumulada, cálculo especial, según semana epidemiológica. 2014- 2015/p

Semana Epidemiológica	Casos notificados				Mediana 2010 - 2014		Cálculo Especial (1)
	2014		2015		Sem.	Sem.	
	A	AC	A	AC	A	AC	
23	1	15	0	4	1	17	0.9
22	0	14	0	4	1	17	0.9
21	0	14	0	4	1	16	1.0
20	0	14	0	4	1	16	1.0
19	1	14	0	4	1	15	0.9
18	1	13	0	4	1	15	0.9
17	1	12	0	4	0	15	1.0
16	2	11	0	4	0	15	1.5
15	1	9	0	4	2	15	1.4
14	0	8	0	4	3	15	1.4
13	2	8	0	4	0.5	13	1.6
12	1	6	1	4	1	12	1.5
11	0	5	0	3	2	11	1.2
10	2	5	1	3	1	11	1.4
09	0	3	0	2	2	9	1.6
08	0	3	0	2	1	8	1.6
07	0	3	1	2	1	6	1.7
06	0	3	1	1	2.5	5	1.7
05	0	3	0	0	2.5	5	1.7
04	1	3	0	0	0.5	2	1.6
03	0	2	0	0	2	2	1.6
02	2	2	0	0	1	1	1
01	0	0	0	0	1	1	1

A: Actual, AC: Acumulados

(1) Índice epidémico: Es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata de I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24 la incidencia se considera normal, si es menor o igual a 0,75 incidencia baja, si es mayor o igual a 1,25 incidencia alta.

Cálculo especial: En enfermedades de baja incidencia (<150 casos anuales) no se usa el índice epidémico. El cálculo especial para estas enfermedades es el promedio de los casos notificados en los 5 años anteriores en la semana actual, las 2 semanas precedentes y las dos siguientes.

Sólo en dos regiones de salud se han confirmado casos de tos ferina en 2015, las cuales son Chiriquí (3 casos) y San Miguelito (1 caso). En las regiones de salud de Bocas del Toro, Coclé, Colón, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Este, Panamá Oeste, Panamá Metro, Veraguas, Kuna Yala y Ngabe Buglé no se han identificado casos hasta la semana 23.

Casos de Tos ferina, según grupo de edad y región de salud. Panamá. 2015/p

GRUPO DE EDAD	REGIÓN				REPÚBLICA	
	CHIRIQUI		SAN MIGUELITO		Casos	Tasa
	Casos	Tasa	Casos	Tasa		
<1 AÑO	0	0	1	17.84	1	1.34
1- 4 AÑOS	3	8.67	0	0.00	3	1.01
TOTAL	3	0.66	1	0.28	4	0.10

Fuente: Departamento de Epidemiología

De los 4 casos, un caso no fue vacunado aunque ya debería haber recibido las tres primeras dosis de vacuna contra la tos ferina, según esquema y edad, dos casos habían recibido 3 dosis y un caso 4 dosis. Ver tabla siguiente.

Antecedentes de vacunación de casos de Tos ferina, según grupo de edad. Panamá 2015/p

GRUPO DE EDAD	CASOS DE TOS FERINA	DOSIS DE VACUNA ANTI PERTUSSICA					
		NO VACUNADO	1DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS	DESCONOCIDO
< 1 AÑO							
<3MESES							
3 A 6MESES							
7 A 11 MESES	1	1					
1-4 AÑOS	3				2	1	
TOTAL	4	1			2	1	

Fuente: Departamento de Epidemiología

Esquema de vacunación contra la tos ferina. República de Panamá. 2015

Tipo de vacuna	EDAD A VACUNAR	Nº DE DOSIS	INTERVALO ENTRE CADA DOSIS	DOSIS, VÍA Y LUGAR DE APLICACIÓN
Hexavalente (1) (DaPT-Hib-HepB-IPV)	2-4-6 meses	3	4-8 semanas	0.5 cc intramuscular área del muslo (antero lateral)
Tetavalente (DPT-Hib)	18 meses	1er. Refuerzo	Hasta 47 meses como primer refuerzo, si el niño no llega oportunamente	0.5c.c. Vía Intramuscular en el muslo (cara antero lateral)
DPT	4 años	2do Refuerzo	De 2 a 3 años después del primer refuerzo con Tetavalente	0.5c.c. Vía Intramuscular en el muslo (cara antero lateral)
Tdap (adacel) (2)	10 años	Refuerzo	Ninguno	0.5 c.c vía intramuscular, en el músculo deltoides
Tdap (Adacel) (3)	A todas las Embarazadas en cada embarazo a partir del 3er Trimestre en el Control Pre Natal y a su pareja. En el Puerperio Inmediato a las Puérpera y a su pareja y a los cuidadores del niño.	Refuerzo	Ninguno	0.5 c.c vía intramuscular en el deltoides.
Tdap (Adacel) (4)	Funcionarios de Salud, Cuidadores de los Recién Nacidos. Pareja de Embarazada y Puérperas. Manipuladores de Alimentos. En el Perifococo	Refuerzo	Ninguno	0.5 c.c vía intramuscular en el deltoides.

(1)Se puede aplicar hasta los 24 meses, si el niño llega después de los 15 meses sin haber sido vacunado antes. Se dará continuación con **Penta** a los niños que ya empezaron vacunación hasta completar la cohorte.

(2)Si el niño no completo el esquema de Penta o DPT y está en edad escolar (6años), aplicar la vacuna (Tdap).

(3) La Tdap se aplicara como una dosis en **cada embarazo** y reemplazara cualquiera de las dosis de Td Adulto.


(4) Se aplicará en vacunación perifocal a contactos de casos sospechosos de Tosferina/Síndrome Coqueluchoide de 4-64 años.

Fuente: Programa Ampliado de Inmunizaciones. MINSA

Dos casos confirmados de tos ferina residen en el corregimiento de David, distrito de David, un caso en el corregimiento de Tijera, distrito de Boquerón y un caso en el corregimiento de Belisario Porras, distrito de San Miguelito. Ver mapa siguiente.

Se han confirmado como síndrome coqueluchoide 64 casos, los cuales proceden de 13 de las 15 regiones de salud. No se ha notificado caso de síndrome coqueluchoide de la Región de Herrera y ni Veraguas.

Casos de Tos ferina y Síndrome coqueluchoide, según corregimiento, República de Panamá 2015/p



/p: Datos hasta semana 23

Fuente : Departamento de Epidemiología MINSA.

Hasta la semana 23 de 2015 no se han notificado defunciones por tos ferina.