MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE SALUD
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA

BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO No 4: CHIKUNGUNYA

Semana: 14 a 17

Fecha de Elaboración: 8 de mayo de 2017

02 al 29 de abril del 2017

Elaborado: *Dra. Lizbeth Cerezo*
Revisado: *Dr. Israel Cedeño*

En estas 16 primeras semanas del 2017 se han estudiado 716 casos por el virus de Chikungunya, en este mes de abril se confirman 5 casos, los cuales fueron en la semana epidemiológica 12, 13, 14, 15 y 16 en regiones que **no** habían identificado la circulación del virus (Bocas del Toro) y registrado casos (Los Santos, y P. Norte); por lo que en total son 9 casos (uno importado). (Ver y gráfico Nº1)

Los casos registrados el 33% (3/9) está registrado en la región Metropolitana, ubicados en dos semanas epidemiológicas. (Ver tabla Nº1)

El 66% (6/9) de los casos se han registrado en las mujeres; y el grupo de edad con mayor proporción es 25 a 34 años con un 44% (4/9). (Ver tabla N°2 y N°3)

Tabla Nº1 Número y proporción de casos confirmados de Chikungunya según región de salud y Corregimiento en Panamá, 2017 (sem 17)

Región	Corregimiento	N° Casos	Total	%
Bocas del Toro	Isla Batimentos	1	1	11
Chiriquí	San Lorenzo	1	1	11
Los Santos	Santa Ana	1	1	11
Metropolitana	Ancón	1		
	Calidonia	1		
	Curundú	1	3	33
P. Norte	Las Cumbres	1		
	Alcaode Díaz	1	2	22
P. Oeste	Pto. Caimito	1	1	11
Total		9	**9**	100

Fuente: Departamento Nacional de epidemiologia/MINSA

Gráfico Nº1.- Número de casos confirmados de Chikungunya por laboratorio según semanas epidemiológicas, República de Panamá, Año 2017 (sem 17).



Fuente: Departamento Nacional de epidemiologia/MINSA

Tabla Nº2 Número y proporción de casos confirmados de Chikungunya según sexo en Panamá, 2017 (sem 17)

Sexo	N° Casos	%
Hombre	3	33.3
Mujer	6	66.7
Total	**9**	100

Fuente: Departamento Nacional de epidemiologia/MINSA

Tabla Nº3 Número y proporción de casos confirmados de Chikungunya según grupo de edad en Panamá, 2017 (sem 17)

Grupo de Edad	Casos	%
menor de 1	0	0.0
1-4	0	0.0
5-9	0	0.0
10-14	0	0.0
15-19	1	11.1
20-24	1	11.1
25-34	4	44.4
35-49	2	22.2
50-59	1	11.1
60-64	0	0.0
65+	0	0.0
Total	**9**	100.0

Fuente: Departamento Nacional de epidemiologia/MINSA

Medidas de Prevención y Control

Mantener el abordaje integral ante un caso sospechoso y la investigación de campo donde se debe realizar búsqueda activa de febriles, aplicación de larvicida y orientación a la comunidad sobre **eliminación de criaderos.**

A **la población y a la comunidad en general** se les solicita:

1. Tomar al menos 5 minutos diarios para revisión y eliminación de criaderos en su vivienda(escurridor platos, debajo del fregador, canales de techo, bebedero de animales, tanques de almacenaje de agua, platillos, vasos, tinas de lavar, canales de aguas estancadas, plantas acuáticas, entre otros)
2. Limpieza de lotes, piscinas y fuentes
3. Revisión y control de Piscinas y fuentes de agua para evitar que se conviertan en criaderos
4. Tener las Llantas bajo techo
5. Los repelentes contra insectos que contienen DEET, picaridina e IR3535 son seguros para las mujeres embarazadas y las que están amamantando, así como para los niños mayores de 2 meses, si se usan de acuerdo con las instrucciones del producto.
6. No se deben usar productos que contengan aceite de eucalipto o de limón en niños menores de 3 años.
7. Usar mosquiteros al descansar, en las cunas y coches de los bebes.
8. Tener mallas en ventanas y puertas.

9. Cualquier denuncia de criaderos hacerla al 311.

A los viajeros a áreas con casos autóctonos

1. Use camisas de manga larga y pantalones largos.
2. Use repelentes contra insectos registrados en la EPA que contengan DEET, picaridina, aceite de eucalipto limón (OLE por sus siglas en ingles) o IR3535. Siempre utilícelos según las instrucciones.
3. Los repelentes contra insectos que contienen DEET, picaridina e IR3535 son seguros para las mujeres embarazadas y las que están amamantando, así como para los niños mayores de 2 meses si se usan de acuerdo con las instrucciones del producto. No se deben usar productos que contengan aceite de eucalipto de limón en niños menores de 3 años.
4. Use ropa y equipos (como botas, pantalones, medias y carpas) tratados con permetrina.
5. Permanezca y duerma en habitaciones con mosquiteros, mallas en las ventanas y puertas, o aire acondicionado.
6. Al regresar de viaje, si presenta síntomas de alerta (fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular, dolor articular, erupción cutánea, ojos rojos, náuseas, vómitos, diarrea, malestar general) debe acudir a atención médica.

Eliminemos los criaderos