



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE SALUD-DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO # 4


Semana: No.42

31 de Octubre de 2016

Editoras: Dra. Yadira de Moltó/ Licda. Adriana García /Dr. Israel Cedeño

Comportamiento histórico de la tos ferina.


Gráfico N°1



Nota: :tasa por 100 000 habitantes. Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica MINSa-CSS

En el 2015, hasta la semana 42 se evaluaron 194 casos sospechosos de tos ferina y hasta la misma semana de 2016 se han evaluado 116 casos sospechosos, distribuidos por semana epidemiológica según se observa en el siguiente gráfico.

Gráfico N°2



Comparado con el 2015 se observa reducción de casos de tosferina acumulados a la semana 42 de 2016, 3 casos, mientras que en 2015 a la misma semana se notificaron 9 casos. Ver tabla siguiente.

Tos ferina: Casos y mediana actual y acumulada, cálculo especial, según semana epidemiológica.2015- 2016/p.

Semana Epidemiológica	Casos notificados				Mediana 2011 - 2015		Cálculo Especial (1)
	2015		2016		Sem.	Sem.	
	A	AC	A	AC	A	AC	
42	0	9	0	3	0	33	0.38
41	0	9	0	3	0	33	0.38
40	0	9	0	3	0	33	0.88
39	0	9	0	3	1	31	1.18
38	1	9	0	3	1	30	1.24
37	0	8	0	3	2	28	1.18
36	0	8	0	2	0	25	1.21
35	0	8	0	2	0	24	1.21
34	0	8	0	2	0	24	1.1
33	0	8	0	2	2	23	1.1
32	0	8	0	2	1	21	1.0
31	0	8	0	2	0	17	1.1
30	0	8	0	2	0	15	0.7
29	0	8	0	2	1	15	0.5
28	0	8	0	2	0	15	0.4
27	0	8	0	2	0	15	0.5
26	0	8	0	2	0	15	0.5
25	0	8	0	2	0	15	0.5
24	3	8	0	2	0	15	0.5
23	0	5	0	2	0	15	0.4
22	1	5	0	2	0	14	0.6
21	0	4	0	2	0	14	0.5
20	0	4	0	2	0	14	0.5
19	0	4	0	2	0	13	0.5
18	0	4	0	2	0	13	0.6
17	0	4	0	2	0	12	0.8
16	0	4	0	2	0	11	1.26
15	0	4	0	2	0	9	1.24
14	0	4	0	2	1	8	1.26
13	0	4	0	2	0	8	1.1
12	1	4	0	2	1	6	0.9
11	0	3	0	2	0	5	0.5
10	0	3	0	2	1	5	0.6
09	1	3	0	2	1	3	0.4
08	0	2	0	2	0	3	0.5
07	1	2	0	2	0	3	0.5
06	1	1	0	2	1	3	0.3
05	0	0	0	2	0	2	0.3
04	0	0	0	2	0	2	0.4
03	0	0	0	2	0	1	0.4
02	0	0	0	2	0	1	0.4
01	0	0	2	2	0	0	0.4

A: Actual, AC: Acumulados

(1) Índice epidémico: Es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata de I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24 la incidencia se considera normal, si es menor o igual a 0,75 incidencia baja, si es mayor o igual a 1,25 incidencia alta.

Cálculo especial: En enfermedades de baja incidencia (<150 casos anuales) no se usa el índice epidémico. El cálculo especial para estas enfermedades es el promedio de los casos notificados en los 5 años anteriores en la semana actual, las 2 semanas precedentes y las dos siguientes.

Fuente: departamento de Epidemiología. MINSA.

Defunciones:

No se han notificado defunciones por tos ferina en el año 2016.


Solamente en tres regiones de salud se han confirmado casos de tos ferina en 2016, las cuales son, Panamá Norte (1 caso), Panamá Oeste (1 caso) y Panamá Este (1 caso). En las regiones de salud de Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Metro, Panamá Norte, San Miguelito, Veraguas y Kuna Yala no se han identificado casos hasta la semana 40. Ver en la siguiente tabla :

Casos de Tos ferina, según grupo de edad y región de salud. Panamá. 2016/p

GRUPO DE EDAD	Región de salud						REPÚBLICA	
	P. Este		P. Norte		P. Oeste		Casos	Tasa
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa		
<1 AÑO	1	49.4			1	21.1	2	2.69
1- 4 AÑOS							0	0
5-9			1	4.63			1	0.28
TOTAL	1	0.73	1	0.39	1	0.35	3	0.07

/p: Datos hasta semana 42. Fuente: Departamento de Epidemiología. MINSA

Casos de Tos ferina y Síndrome coqueluchoide, según corregimiento, República de Panamá 2016/p SE30



/p: Datos hasta Semana 42. Fuente : Departamento de Epidemiología MINSA.

De los 3 casos, no hay información del niño de 6 años, los dos casos de un mes no aplican aún para vacunación pero sus madres no fueron vacunadas en el embarazo. Ver tabla siguiente.

Antecedentes de vacunación de casos de Tos ferina, según grupo de edad. Panamá 2016/p.

GRUPO DE EDAD	CASOS DE TOS FERINA	DOSIS DE VACUNA ANTI PERTUSSICA					
		NO VACUNADO	Madre NO Vacunada en el embarazo	1DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	DESCONOCIDO
< 1 AÑO	2						
<3MESES	2	2	2				
3 A 6MESES							
7 A 11 MESES							
1-4 AÑOS							
5-9 AÑOS	1						1
TOTAL							

/p: Datos hasta Semana 42. Fuente: Departamento de Epidemiología. MINSA

Esquema de vacunación contra la tos ferina. República de Panamá. 2016

Tipo de vacuna	EDAD A VACUNAR	Nº DE DOSIS	INTERVALO ENTRE CADA DOSIS	DOSIS, VÍA Y LUGAR DE APLICACIÓN
Hexavalente (1) (DaPT-Hib-HepB-IPV)	2-4-6 meses	3	4-8 semanas	0.5 cc intramuscular área del muslo (anterior lateral)
Tetavalente (DPT-Hib)	18 meses	1er. Refuerzo	Hasta 47 meses como primer refuerzo, si el niño no llega oportunamente	0.5c.c. Vía Intramuscular en el muslo (cara anterior lateral)
DPT	4 años	2do Refuerzo	De 2 a 3 años después del primer refuerzo con Tetavalente	0.5c.c. Vía Intramuscular en el muslo (cara anterior lateral)
Tdap (adacel) (2)	10 años	Refuerzo	Ninguno	0.5 c.c vía intramuscular, en el músculo deltoides
Tdap (Adacel) (3)	A todas las Embarazadas en cada embarazo a partir del 3er Trimestre en el Control Pre Natal y a su pareja. En el Puerperio Inmediato a las Púerpera y a su pareja y a los cuidadores del niño.	Refuerzo	Ninguno	0.5 c.c vía intramuscular en el deltoides.
Tdap (Adacel) (4)	Funcionarios de Salud, Cuidadores de los Recién Nacidos. Pareja de Embarazada y Púerperas. Manipuladores de Alimentos. En el Perifococo	Refuerzo	Ninguno	0.5 c.c vía intramuscular en el deltoides.

(1) Se puede aplicar hasta los 24 meses, si el niño llega después de los 15 meses sin haber sido vacunado antes. Se dará continuación con **Penta** a los niños que ya empezaron vacunación hasta completar la cohorte.

(2) Si el niño no completo el esquema de Penta o DPT y está en edad escolar (6años), aplicar la vacuna (Tdap).

(3) La Tdap se aplicara como una dosis en **cada embarazo** y reemplazara cualquiera de las dosis de Td Adulto.

(4) Se aplicará en vacunación perifocal a contactos de casos sospechosos de Tosferina/Síndrome Coqueluchoide de 4-64 años.

Fuente: Programa Ampliado de Inmunizaciones. MINSA