

BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO N°6: Zika

Fecha de Elaboración: 1 de marzo 2016.

Elaborado: Dra. Lizbeth Cerezo

Revisado: Dra. Lourdes García

Este año hasta la semana epidemiológica No. 8 se han examinado 187 muestras, resultando 131 negativas y 56 positivas de los cuales 50 resultados son autóctonos (uno asintomático), cuatro (4) importados y dos pendiente de determinar su procedencia. Los tipos de muestras que se están examinando son suero y orina (esta última en embarazadas).

A todos los casos sospechosos se les aplica algoritmo de laboratorio donde se descartan primero dengue y chikungunya.

Este año no tenemos embarazadas positivas por virus zika.

Tabla N°1.- Número de casos confirmados de Zika por laboratorio según localidad, República de Panamá, 2015(sem 47) – 2016(sem 8).

Región	Comunidad	Total	2015	2016
Total		94	38	56
Kuna Yala	Mulatupu	5	2	3
	Ustupu/Ogobsucum	16/7	16/7	0
	Achutupu	9	9	0
	Pto. Obaldía**	4	0	4
	Playón Chico	5	3	2
	Narganá	3	1	2
	Corazón de Jesús	5	0	5
	Rio Azúcar	1	0	1
	Rio Sidra	2	0	2
	Cartí Sugdup	21	0	21
	Ailigandi	1	0	1
	Nalugena	1	0	1
	Mamitupu	1	0	1
	Wichubhula	1	0	1
	Metro	Tocumen	5	0
Bella Vista*		1	0	1
*San Francisco**		4	0	4
Bethania**		1	0	1
Panamá Norte	Las cumbres	1	0	1

Fuente: Sisvig, Departamento de Epidemiología –MINSa

*pendiente determinar si es autóctono o importado.

** Casos importados (4), todos del año 2016.


Tabla N°2.- Número de casos confirmados de Zika por laboratorio según sexo, República de Panamá, 2016(sem 8).

Sexo	Casos	%
Masculino	27	48.2
Femenina	29	51.8
Total	56	100.0

Fuente: Sisvig, Departamento de Epidemiología- MINSa

Según sexo el 48.2% son femeninos y el 51.8% masculino. Ver Tabla N° 2.

Gráfico N°1.- Número de casos confirmados de Zika por laboratorio según semanas epidemiológicas, República de Panamá, Año 2016_(sem 8).



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología

En todos los grupos de edad se han confirmado casos. Los grupos de edad más afectados van desde los 25 años hasta los 49 años en un 46.0% con respecto al total. Ver Tabla N° 3.

Tabla N°3.- Número de casos confirmados de Zika por laboratorio según grupo de edad, Rep. Panamá, 2016_(sem 8).

Grupo de Edad	Frecuencia	Porcentaje
menor de 1	3	4.0
1-4	4	8.0
5-9	1	2.0
10-14	5	10.0
15-19	2	4.0
20-24	2	4.0
25-34	13	24.0
35-49	13	22.0
50-59	9	16.0
60-64	1	4.0
65+	1	2.0
Inespecífico	0	0.0
Total	56	100.0

Fuente: Sisvig, Departamento de Epidemiología-MINSA

Los síntomas y signos que han presentado los casos confirmados con mayor frecuencia son: fiebre, exantema y cefalea.

Medidas de Prevención y Control

Generalidades de Zika

En la actualidad, no existe una vacuna para prevenir la enfermedad por el virus del Zika ni medicamentos para tratarla. Cuatro de cada cinco personas 4/5 (80%) que contraen la infección por el virus del Zika puede que no presenten síntomas. La enfermedad causada por el virus del Zika es por lo general leve y no requiere hospitalización. Toda la población y en especial mujeres embarazadas deben protegerse [evitando las picaduras de los mosquitos Aedes](#).

Las complicaciones más frecuentes que se están observando causadas por zika son: recién nacidos con cabezas más pequeñas de lo normal y enfermedad del sistema nervioso (parálisis) que puede llevar a la muerte.

A la población y a la comunidad en general se les solicita:

1. Tomar al menos 5 minutos diarios para revisión y eliminación de criaderos en su vivienda (escurridor platos, debajo del fregador, canales de techo, bebedero de animales, tanques de almacenaje de agua, platillos, vasos, tinas de lavar, canales de aguas estancadas, plantas acuáticas, etc.)
2. Limpieza de lotes
3. Revisión y control de Piscinas y fuentes de agua para evitar que se conviertan en criaderos
4. Tener las Llantas bajo techo
5. Los repelentes contra insectos que contienen DEET, picaridina e IR3535 son seguros para las mujeres embarazadas y las que están amamantando, así como para los niños mayores de 2 meses, si se usan de acuerdo con las instrucciones del producto.
6. No se deben usar productos que contengan aceite de eucalipto o de limón en niños menores de 3 años.
7. Usar mosquiteros al descansar, en las cunas y coches de los bebés.
8. Tener mallas en ventanas y puertas.
9. Cualquier denuncia de criaderos hacerla al 311.


A los viajeros

1. Use camisetas de manga larga y pantalones largos.
2. Use repelentes contra insectos registrados en la EPA que contengan DEET, picaridina, aceite de eucalipto limón (OLE por sus siglas en inglés) o IR3535. Siempre utilícelos según las instrucciones.
3. Los repelentes contra insectos que contienen DEET, picaridina e IR3535 son seguros para las mujeres embarazadas y las que están amamantando, así como para los niños mayores de 2 meses si se usan de acuerdo con las instrucciones del producto. No se deben usar productos que contengan aceite de eucalipto de limón en niños menores de 3 años.
4. Use ropa y equipos (como botas, pantalones, medias y carpas) tratados con permetrina.
5. Permanezca y duerma en habitaciones con mosquiteros, mallas en las ventanas y puertas, o aire acondicionado.
6. Al regresar de viaje, si presenta síntomas de alerta (fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular, dolor articular, erupción cutánea, ojos rojos, náuseas, vómitos, diarrea, malestar general) debe acudir a atención médica.



Eliminemos los criaderos

Eliminemos al mosquito Aedes en sus cuatro fases de reproducción:
Huevo, larva, pupa y mosquito adulto.



Juntos podemos lograrlo.