



MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ  
DIRECCION GENERAL DE SALUD  
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA

**BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO No 9: CHIKUNGUNYA**

**Semana: No.36 a la 39**

**Fecha de Elaboración:** 10 de octubre de 2016

4 de agosto al 01 de septiembre del 2016

*Elaborado:* Dra. Lizbeth Cerezo

*Revisado:* Dra. Lourdes García

En el 2016, desde la semana 36 hasta la 39 se han sospechado y examinado 347 casos, el cual resultó uno positivo; por lo que en su totalidad en el año se han estudiado 2135 casos por el virus de Chikungunya, con 11 casos positivo (6 autóctonos, 5 importados).

Los casos están registrados en diferentes regiones sanitarias. (Ver tabla N°1) y distribuido en diferentes semanas epidemiológicas. (Ver grafico N°1)

**Tabla N°1 Número de casos confirmados de Chikungunya según región de salud y Corregimiento en Panamá, 2016 (sem39)**


| Región    | Corregimiento  | Casos     | Total |
|-----------|----------------|-----------|-------|
| Total     |                | <b>11</b> |       |
| Kuna Yala | Ailigandi      | 1         | 2     |
|           | Puerto Obaldía | 1         |       |
| Colón     | Cristóbal**    | 1         | 1     |
| Coclé     | Pocrí          | 1         | 1     |
| Metro     | Tocumen        | 1         | 3     |
|           | Pmá. Viejo**   | 1         |       |
|           | 24 diciembre   | 1         |       |
| P. Norte  | Alcalde Díaz   | 1         | 1     |
|           | Las cumbres*   | 1         | 1     |
| Importado | **             | 2         | 2     |

Fuente: Departamento Nacional de epidemiologia/MINSA

\*casos importado viviendo en esa región sanitaria

\*\*caso importado que no vive en el país

**Gráfico N°1.- Número de casos confirmados de Chikungunya por laboratorio según semanas epidemiológicas, República de Panamá, Año 2016(sem 39).**



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiologia

## Medidas de Prevención y Control

Mantener el abordaje integral ante un caso sospechoso y la investigación de campo donde se debe realizar búsqueda activa de febriles, aplicación de larvicida y orientación a la comunidad sobre **eliminación de criaderos**.

A la población y a la comunidad en general se les solicita:

1. Tomar al menos 5 minutos diarios para revisión y eliminación de criaderos en su vivienda (escurridor platos, debajo del fregador, canales de techo, bebedero de animales, tanques de almacenaje de agua, platillos, vasos, tinas de lavar, canales de aguas estancadas, plantas acuáticas, entre otros)
2. Limpieza de lotes, piscinas y fuentes
3. Revisión y control de Piscinas y fuentes de agua para evitar que se conviertan en criaderos
4. Tener las Llantas bajo techo
5. Los repelentes contra insectos que contienen DEET, picaridina e IR3535 son seguros para las mujeres embarazadas y las que están amamantando, así como para los niños mayores de 2 meses, si se usan de acuerdo con las instrucciones del producto.
6. No se deben usar productos que contengan aceite de eucalipto o de limón en niños menores de 3 años.
7. Usar mosquiteros al descansar, en las cunas y coches de los bebés.
8. Tener mallas en ventanas y puertas.
9. Cualquier denuncia de criaderos hacerla al 311.

## A los viajeros a áreas con casos autóctonos

1. Use camisas de manga larga y pantalones largos.
2. Use repelentes contra insectos registrados en la EPA que contengan DEET, picaridina, aceite de eucalipto limón (OLE por sus siglas en inglés) o IR3535. Siempre utilícelos según las instrucciones.
3. Los repelentes contra insectos que contienen DEET, picaridina e IR3535 son seguros para las mujeres embarazadas y las que están amamantando, así como para los niños mayores de 2 meses si se usan de acuerdo con las instrucciones del producto. No se deben usar productos que contengan aceite de eucalipto de limón en niños menores de 3 años.
4. Use ropa y equipos (como botas, pantalones, medias y carpas) tratados con permetrina.
5. Permanezca y duerma en habitaciones con mosquiteros, mallas en las ventanas y puertas, o aire acondicionado.
6. Al regresar de viaje, si presenta síntomas de alerta (fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular, dolor articular, erupción cutánea, ojos rojos, náuseas, vómitos, diarrea, malestar general) debe acudir a atención médica.



**Eliminemos los criaderos**