




Editores: Dra. Lizbeth Cerezo / Licdo. Carlos Victoria/Licdo. Vizcaino



**Casos actuales y acumulados de malaria confirmados según región de salud en Panamá 2014**

Región	Casos		Tasa
	Actuales	Acumulados	
Ngobe Bugle	0	43	22.8
Darién	1	192	294.1
P. Este	6	408	313.8
Guna Yala	0	143	346.6
Importados	0	9	
<b>Total País</b>	<b>7</b>	<b>795</b>	<b>20.3</b>

Se han examinado a nivel nacional 74060 muestras resultando positivas 795, de los cuales 9 son importados; de estos 7 son de *P. falciparum*.


En esta semana se registran 7 casos, se actualizan 21 casos de semanas anteriores.

En las 14 regiones de salud se captan, notifican y diagnostican casos.


Fuente: departamento de control de vectores/sección estadística

Para esta semana en el 2013 teníamos 637 casos, por lo que este año tenemos 158 mas acumulados que el año pasado.


En la sem 46 se presentan 2 brotes en la comunidades de Ipetí Kuna en la región Panamá Este y Playón Chico y Playón Grande en la región de Guna Yala.



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE SALUD  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES  
CASOS DE MALARIA POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA, SEGÚN FECHA DE INICIO DE SINTOMA  
O TOMA DE MUESTRA SANGUÍNEA  
AÑOS: 2013 - 2014



MALARIA, CANAL ENDÉMICO 2009 - 2013  
Y CASOS NOTIFICADOS SEGÚN SEMANA EPIDEMIOLÓGICA AÑO 2014 sem 49




Casos y tasa de incidencia de paludismo según año en Panamá 2001-2014 (sem 49)

Fuente: Departamento de Control de Vectores / Sección de Estadística


Fuente: departamento de control de vectores/MINSA Panamá

AREAS DONDE PERSISTE TRANSMISION DE MALARIA  
REPÚBLICA DE PANAMÁ, AÑO 2014.



Anopheles albimanus

Casos de paludismo según plasmodium en Panamá 2001-2014 sem 49



Fuente: departamento de control de vectores/MINSA Panamá

Desde el año 2010 no se registra casos autóctonos en el país de *P. falciparum*; los siete casos que se registran este año son de África (4) y Colombia (3).

De los 788 casos de vivax 2 son importados de Colombia.

**Medidas de Prevención y pre-eliminación**

- Búsqueda activa de casos
- Abordaje integral de los casos sospechosos en la investigación de campo.
- Orientación a la comunidad sobre eliminación de focos.
- Aplicación de larvicidas en focos.
- Rociado intradomiciliar.
- Seguimiento de casos
- Tratamiento estrictamente supervisado
- Primer grupo de técnicos de control de vectores capacitado en "Reorientación de la malaria con miras a la preeliminación-eliminación" en todas las regiones de salud.

**Limitantes**

- Barreras interculturales en las comarcas indígenas
- Dificultad en la adherencia al medicamento

**Referencias bibliográficas**

1. [www.paho.org/paludismo](http://www.paho.org/paludismo)