

**MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA**

**RESUMEN SEMANAL DE EVENTOS DE INTERÉS
EPIDEMIOLÓGICO**

Dengue: En esta semana se registraron 3 casos de dengue clásico (DC) y se actualizan 27 para un total de 631 casos y continuamos con un caso de dengue hemorrágico (DH) en el año. El canal endémico nacional se encuentra actualmente en zona de seguridad.

Casos Confirmados por Laboratorio de Dengue Clásico y Hemorrágico e Índice de Infestación según Región de Salud. República de Panamá. Semana 21 mayo 2010

Región	Dengue Clásico y Hemorrágico (DH)		% de Infestación por Aedes
	DC	DH	
República	631	1	2.9
Bocas del Toro	80	0	1.4
Coclé	71	1	0.7
Colón	21	0	1.5
Chiriquí	105	0	1.4
Darién	0	0	2.5
Herrera	39	0	2.0
Los Santos	33	0	2.9
Panamá Este	10	0	1.0
Panamá Metro	135	0	5.5
Panamá Oeste	45	0	1.7
Kuna Yala	0	0	0.9
San Miguelito	86	0	9.6
Veraguas	5	0	0.9
Ngäbe Bugle	1	0	Sin información

Se inspeccionaron 17,177 predios en 735 manzanas, resultando 199 manzanas positivas. Se eliminaron 30,193 recipientes inservibles. Se nebuliza con equipo pesado 729 predios y 4,866 con equipo liviano; se aplicaron 286 actas, 92 de compromiso y 194 de recomendación de sanción. San Miguelito, Metro, Darién y Herrera presentan los niveles de infestación mas altos.

Recomendación: Es necesario continuar con la insistencia a la población del manejo ambiental con énfasis en control de los criaderos potenciales.

Malaria: Se registran 5 nuevos casos en la semana 4 por P. vivax y 1 por P. falciparum, en Bocas del Toro (2), Darién (2) y Kuna Yala (1). Las Regiones con mayor número de casos según procedencia, son Darién (86), Panamá Este (70) y las Comarcas Ngäbe Bugle (24) y Kuna Yala (27).

Gripe/Influenza Estacional: El canal endémico nacional se encuentra en zona de éxito, pero con incremento de casos por regiones así: **En zona de alerta: Herrera, Chiriquí y Bocas del Toro Darién; en zona de éxito, pero con aumentos de casos: Coclé, Colon y Panamá Este;** las demás en zona de seguridad o éxito, sin mayores variaciones.

Neumonía/Bronconeumonía: El canal endémico a nivel nacional con aumento de casos. Se mantienen con más casos de lo esperado: Bocas del Toro, Coclé, Darién, Chiriquí, Herrera, Veraguas. Recordar notificar inmediatamente los casos de Infección Respiratoria Aguda Grave.

Diarreas: En el canal endémico nacional se refleja una disminución en el número de casos con respecto a las semanas anteriores. No obstante en las regiones de salud de Bocas del Toro, Coclé y San Miguelito se registra aumento del numero de casos..

Hantavirus: Se actualiza un caso de la semana epidemiológica N°19. Se trata de un paciente de Agua Fría, Darién, el cual se expuso a factores de riesgo en la provincia de Los Santos. A la fecha se registran nueve casos de Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH); tres en Los Santos; dos de Guararé, y un (1) caso (fallecido) de Las Tablas. Herrera dos casos (1) caso (fallecido) de Chitré, y un caso de Los Pozos; Coclé dos (2) casos uno (fallecido) de Penonomé, un (1) caso de Natá y uno (1) de Darién. Se recomienda fortalecer la vigilancia epidemiológica, conservación de alimentos en envases o recipientes resistentes a roedores, mantener los patios y alrededores limpios; libres de herbazales, desechos, escombros y eliminar elementos en desuso que permita la nidación de roedores.



Departamento de Vigilancia Epidemiológica
Teléfono: 512-9267, 512-9147, Fax: 512-9377

**Semana epidemiológica N° 21
(del 23/05/2010 al 29/05/2010)**

Número de casos, actual y acumulados de algunos eventos de interés epidemiológico. Años: 2009 y 2010.

Nombre del Evento	Años			
	2009		2010	
	A	Ac.	A	Ac.
Malaria	7	390	5	245
Dengue Clásico	29	604	3	631
Dengue Hemorrágico	0	2	0	1
Enfermedad Meningocócica	0	12	0	4
Tos ferina	1	38	0	16
Hantavirus	0	19	0	9
Sínd. Gripal/Influenza	4957	67726	3132	56707
Bronconeumonía/Neumonía	167/156	2988/1499	106/148	2170/2343
Diarrea	4333	74009	4091	101566
Influenza A H1N1	0	0	0	1

Nota: A = casos de la semana. Ac = Acumulados a la semana
Fuente: Notificación semanal de enfermedades obligatorias de cada una de las regiones (cifras preliminares).

ALERTAS EPIDEMIOLÓGICAS

Gripe/Influenza Estacional: Ante el incremento se las Gripes se mantienen las recomendaciones de:

1. Intensificar la campaña de vacunación contra de Influenza.
2. Asegurar la toma de muestras para la vigilancia centinela para identificar virus respiratorio circulantes.
3. Fortalecer la orientación para la comunidad sobre las medidas de higiene respiratoria y lavado de manos.
4. Mantener las medidas de triage de los casos respiratorios en las instalaciones de salud.
5. Mantener un monitoreo continuo del comportamiento de las infecciones respiratorias, incluyendo las hospitalizaciones debido a complicaciones de estas infecciones.

DIARREAS:



Se recomienda adoptar y mantener las medidas generales de higiene y saneamiento básico en los hogares, cocinas institucionales, comercios, lugares de preparación y expendio de alimentos; utilización de agua segura para consumo y preparación de alimentos, lavado frecuente de manos, conservación adecuada de alimentos. Adoptar medidas de higiene personal y de su ambiente cercano así como la disposición adecuada de residuos líquidos y sólidos. Ante síntomas y signos de enfermedad diarreica acudir al centro de atención médica más cercano.

Porcentaje de notificación:- Regiones de Salud: **100% (14/14)** - Instalaciones de Salud: 93.2 % (259/278). La región C. Ngäbe Bugle con menos de 80% de notificación de sus instalaciones.

Editores: Dra. Lourdes García, Dra Lizbeth Cerezo.

Colaboradores: Dra. Lizbeth Cerezo, Dr. Héctor Cedeño, Dr. Guillermo Campos, Téc. Superior: Dennys Rodríguez DeGracia.

CURVAS ENDÉMICAS NACIONALES DE INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO



Eventos Internacionales de Interés Epidemiológico

Fiebre amarilla en el Camerún: 27 de mayo de 2010 -- El 25 de enero de 2010, el Ministerio de Salud del Camerún notificó un caso de fiebre amarilla en el distrito de Kumba, en la zona sudoccidental del país, cerca de la frontera con el estado nigeriano de Cross River.

Influenza a H1N1 2009: “La actividad de la influenza es baja en casi todo el Hemisferio Norte y el Hemisferio Sur con clima templado, excepto Chile, que registró áreas con actividad de la influenza H1N1 2009. En la región europea la actividad de la influenza es baja y se encuentra en niveles normalmente observados durante el verano. . En África subsahariana, la actividad de la influenza H1N1 2009 ha disminuido significativamente en el oeste de África”. CDC 28 de mayo de 2010.