

RESUMEN SEMANAL DE EVENTOS DE INTERÉS
EPIDEMIOLÓGICO

Dengue Clásico: No se registran casos nuevos en esta semana. Se actualizan 5 casos de semanas anteriores (Chiriquí 1, P. Oeste 1 y P. Metro 3). Acumulados 185 casos. Canal endémico en zona de éxito.

Dengue clásico y hemorrágico acumulados en el año 2011 según región e infestación por *Aedes aegypti* (Aa). Semana N°22

Región	TIPO DE DENGUE		% de Infestación por Aa (*)
	Clásico	Hemorrágico	
TOTAL	185	0	2.1
Bocas del Toro	37	0	0.7
Coclé	4	0	0.9
Colón	28	0	0.5
Chiriquí	8	0	1.6
Darién	1	0	0.9
Herrera	3	0	1.1
Los Santos	0	0	1.4
Panamá Este	0	0	1.0
Panamá Metro	63	0	3.5
Panamá Oeste	6	0	4.5
Kuna Yala	0	0	0.6
San Miguelito	35	0	4.8
Veraguas	0	0	0.5
Ngábe Bugle	0	0	Sin información

(*) Fuente: Dpto. de Control de Vectores

Infestación por *Aedes aegypti*: Infestación nacional en 2.1% con aumento en comparación de la semana pasada. Las regiones con mayor riesgo de transmisión y con aumento del índice de infestación en la región de salud de P. Oeste, San Miguelito y Metro).

Control vectorial: Se inspeccionaron 594 manzanas encontrando 173 positivas por *Aedes*. Se identificaron 386 criaderos potenciales; en recipientes útiles 232, en inservibles 151 y en naturales 3; la región Metropolitana con el 40% de estos recipientes. Se nebulizó 3745 predios con equipo liviano y 766 predios con equipo pesado. Se efectuaron 133 recomendaciones de sanción y 51 actas de compromiso.

Recomendación: Con la activación de los EGI-dengue regionales debemos aumentar las acciones comunitarias para la eliminación de criaderos y la concienciación de la misma, ya que estamos en la época de invierno y con circulación de los serotipo 1, 2 y 3.

Malaria: Se registran 4 nuevos casos por *Plasmodium vivax* en esta semana (Darién 1, Ngábe Bugle 1 y C. Kuna Yala 2); 60 casos menos que el acumulado para la misma semana del año 2010.

Gripe/Influenza Estacional: A nivel nacional el canal endémico se encuentra en zona de éxito, sin embargo las regiones de Chiriquí y Herrera presentan casos superiores a la semana pasada.

Recomendaciones: Vacunar a los grupos priorizados con la vacuna estacional contra la influenza, promover las medidas de etiqueta respiratoria, lavado de manos y auto aislamiento domiciliario. Verificar que los casos cumplan con la definición de caso: fiebre y tos o dolor de garganta y que los sitios centinela estén tomando las muestras establecidas.

Hantavirus: Para esta semana no se reporta caso de Síndrome Cardio Pulmonar por Hantavirus (SCPH). En lo que va del 2011 se han registrado siete (7) casos de SCPH, cuatro (4) casos en la región de salud de Coclé, dos (2) en Los Santos y uno (1) en Veraguas.

Se recomienda a todas las regiones de salud: Fortalecer la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad, promover y adoptar las medidas de prevención y control correspondientes así como la atención oportuna de casos sospechosos.

Semana epidemiológica N° 22
(del 29/05/2011 al 4/06/2011)

Eventos de interés epidemiológico actual y acumulados.
Años: 2010 y 2011.

Nombre del Evento	Años			
	2010		2011	
	A	Ac.	A	Ac.
Malaria	3	248	4	188
Dengue Clásico	39	871	0	185
Dengue Hemorrágico	0	1	0	0
Enfermedad Meningocócica	0	5	0	3
Tos ferina	0	18	0	2
Hantavirus	1	11	0	7
Sind. Gripal/Influenza	2522	59229	2554	56661
Bronconeumonía/Neumonía	91/174	2261/2517	81/185	2013/3921
Diarrea	4245	105849	3559	101021
Influenza A H1N1	0	0	0	1

Nota: A = casos de la semana. Ac = Acumulados a la semana
Fuente: Notificación semanal de enfermedades obligatorias de cada una de las regiones (cifras preliminares).

Alertas Epidemiológicas

Neumonía/Bronconeumonía:

A nivel nacional el canal endémico se encuentra con aumento de casos con relación a la semana anterior en las regiones de B.del Toro, Darién, Herrera, Los Santos, Metro, N. Bugle y Kuna Yala.

Recomendaciones:

1. Notificar inmediatamente los casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) inusitadas, imprevistas, número excesivo de casos o conglomerado y las defunciones de las mismas.
2. Tomar muestras para identificar virus que estén ocasionando IRAG según lo anotado en el numeral anterior.
3. Fortalecer la orientación en la comunidad sobre las medidas de higiene respiratoria y lavado de manos.
4. Mantener las medidas de selección (triage) de los casos respiratorios en las instalaciones de salud.
5. Monitoreo continuo del comportamiento de las infecciones respiratorias, incluyendo las hospitalizaciones con énfasis en las Neumonías y Bronconeumonías.
6. Indicar el tratamiento con Oseltamivir en pacientes con riesgo: embarazada, enfermos crónicos, niños menores de 5 años, adultos de más de 60 años, según protocolo establecido.
7. Intensificar la **vacunación** con **influenza** en los grupos de riesgo: menores de 5 años, embarazadas, crónicos y ancianos.

Porcentaje de notificación: Regiones de Salud: 100% (14/14)


Instalaciones de Salud: 90.3% (250/277). COC, CKY, CNB con menos del 80% de las instalaciones reportadas.

Editores: Dra. Lourdes García, Dra. Rocío Arjona.

Colaboradores: Téc. Sup. Dennys Rodríguez D., Dr. Guillermo Campos, Dra. Lourdes Moreno.


CURVAS ENDÉMICAS NACIONALES DE INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO

DENGUE - CANAL ENDÉMICO 2004-2010
Y CASOS NOTIFICADOS POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA AÑO 2011



Fuente: Departamento de Epidemiología-Sección de Estadística de Vigilancia. Base de Datos de Dengue.

República de Panamá
Enfermedad Diarreica Aguda - Canal Endémico 2006-2010
y casos notificados por semana epidemiológicas. Año: 2011 (p)



Fuente: Departamento de Epidemiología-Sección de Estadística de Vigilancia - Monitoreo semanal.

Eventos nacionales de interés epidemiológico: Brote de Sarampión Importado.


En esta semana epidemiológica No.22 el brote continua circunscrito a el corregimiento de San Francisco, Provincia de Panamá, Región Metropolitana de Salud, con solo cuatro casos confirmados y se han descartado cuatro casos sospechosos.

El R.H. en salud de la Región Metropolitana continua realizando seguimiento de los estudiantes expuestos y sus contactos, además de los contactos directos e indirectos de los casos.


El resto de viajeros expuestos que estuvieron en transito, fueron reportados a través del CNE para su seguimiento en los respectivos países de destino.

Fuente: Departamento de Epidemiología Nacional.

CURVAS ENDÉMICAS NACIONALES DE INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO



Fuente: Departamento de Epidemiología - Sección de Estadística de Vigilancia - Monitoreo semanal.



FUENTE: Departamento de Epidemiología / Sección de Estadística. Monitoreo Semanal de Enfermedades de Notificación Obligatoria.

Evento internacional de interés epidemiológico:

29 de mayo de 2011

La FDA (Food and Drug Administration) de los Estados Unidos, advierten a los consumidores no adquirir ni usar el producto "ViaXtreme", un potenciador sexual comercializado a través de varios sitios en Internet.

Análisis laboratoriales realizados por la FDA confirmaron que "ViaXtreme" contiene sulfoildenafil como ingrediente no declarado. El sulfoildenafil es estructuralmente similar al sildenafil, componente activo del Viagra, una droga aprobada oficialmente para la disfunción eréctil.

Este componente no declarado puede interactuar con los nitratos encontrados en algunas drogas de prescripción y puede bajar la presión sanguínea a niveles peligrosos. Hombres con diabetes, hipertensión, colesterol alto o enfermedades del corazón a menudo consumen medicamentos con nitratos. Consumidores deben dejar inmediatamente de consumir esta medicación y desecharla en caso de tenerla.

Fuente: Oficina Panamericana de la Salud.