

**MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA**

**RESUMEN SEMANAL DE EVENTOS DE
INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO**



Departamento de Vigilancia Epidemiológica
Teléfono: 512-9267, 512-9147, Fax: 512-9377

Dengue: Para esta semana se registran 17 casos nuevos y se actualizan 248 de semanas anteriores, para un total de 6413 casos confirmados de dengue clásico y 28 hemorrágicos en lo que va del año. Se actualizan 10 casos de dengue hemorrágico del HST, todos recuperados e incorporados a su vida cotidiana.

Distribución de casos de Dengue confirmados por Región

Región	Tipo de Dengue		% de infestación por Aedes Aegyti
	Clásico	Hemorrágico	
República	6413	28	0.8
Panamá Oeste	2140	5	0.8
Chiriquí	1096	5	0.3
Metropolitana	1225	8	1.4
San Miguelito	415	5	2.1
Coclé	740	0	0.3
Colón	188	1	0.2
Panamá Este	140	2	0.6
Darién	128	0	0.3
B. del Toro	28	0	0.2
Herrera	106	0	0.4
Veraguas	102	0	0.2
Los Santos	103	2	1.2
Kuna Yala	0	0	2.0
Ngobe Bugle	2	0	-

Ante la situación del Dengue, se están realizando las siguientes acciones:

1. El promedio de casos hospitalizados, sospechosos de Dengue clásico y Dengue Hemorrágico ha disminuido sensiblemente.
2. Se continúa con la Encuesta Entomológica, con la que se priorizan las áreas de riesgo por presencia de mosquitos Aedes, que serán intervenidas.
3. Se encontraron 142 criaderos positivos en 16994 viviendas de 765 manzanas inspeccionadas, (139 con A. aegypti y 13 con A. albopictus), 68.8% (112) en recipientes útiles, 24% (40) en recipientes inservibles y 7.8% (13) en recipientes naturales, lo que indica que la población no está sensibilizada sobre el riesgo existente al mantener recipientes útiles con criaderos.
4. Se realizaron 3866 fumigaciones 2938 equipo liviano y 928 equipo pesado y se aplicaron 54 sanciones y 28 actas de compromiso.
5. Es necesario instar a la población para que en la época seca en que se acumula agua de uso domiciliario, se haga con la debida protección, para evitar que se conviertan en criaderos

Influenza Estacional: el canal endémico a nivel nacional evidencia un descenso en el número de casos, aunque hay incremento en algunas regiones como: BDT, DAR, HER, LST, CHI y COC. Es necesario continuar con la aplicación de las medidas de higiene respiratoria y cumplir con las recomendaciones dadas para la influenza A (H1N1).

Neumonía/BN: El canal endémico de las bronconeumonías y neumonías a nivel nacional, con incremento de casos, aunque en menor número que las dos semanas anteriores, y, generalmente está asociado al aumento de casos de influenza estacional. Este aumento es a expensas de las regiones de salud de BDT, PES, VER, COC, CHI, DAR, HER, POE. El personal de salud mantiene una vigilancia activa para la captación oportuna de los casos.

**Semana epidemiológica N° 51
(del 20/12/2009 al 26/12/2009)**

Número de casos, actual y acumulados de algunos eventos de interés epidemiológico. Años: 2008 y 2009.

Nombre del Evento	Años			
	2008		2009	
	A	Ac.	A	Ac.
Malaria	14	723	14	763
Dengue Clásico	24	1398	17	6413
Dengue Hemorrágico	0	4	0	28
Enfermedad Meningocócica	3	34	0	19
Tosferina	1	99	0	83
Hantavirus	0	14	0	25
Sínd. Gripal/Influenza	3116	218	2324	180708
Bronconeumonía/Neumonía	206/22	11472/1977	105/200	8614/5200
Diarrea	3834	172575	2933	180347
Influenza A H1N1	—	—	0	809

Nota: A = casos de la semana. Ac = Acumulados a la semana
Fuente: Notificación semanal de enfermedades obligatorias de cada una de las regiones (cifras preliminares).

ALERTAS O EPIDEMIAS

INFLUENZA A (H1N1): Se registra un acumulado de 809 casos confirmados con 12 defunciones.

Recomendaciones:

- La población debe continuar con las medidas de higiene personal y respiratorias: Uso de pañuelo desechable al toser o estornudar, lavado frecuente de manos con agua y jabón y, evitar visitar a personas enfermas con gripe.

- No enviar a los niños y adolescentes con síntomas de gripe a la escuela ni a los desfiles patrios.

- Ante síntomas de gripe no automedicarse y, acudir en forma oportuna a las instalaciones de salud, en especial aquellas personas con condiciones que favorecen el desarrollo de complicaciones pulmonares.

-El personal de salud debe continuar con medidas de bioseguridad para el manejo de pacientes sospechosos o confirmados y hacer énfasis en el manejo oportuno de los casos sospechosos que presentan factores de riesgo identificados.

Porcentaje de notificación: Regiones de Salud: **92.9 % (13 /14).**

Instalaciones de Salud: **88.4% (244 /276)**

Editores: Dra. Lourdes Moreno Castillo, Dr. Enrique Castañedas, Dra. Gladys Guerrero

Colaboradores: Dra. Elsa Arenas, Lcda. Elsa Benavides A.

CURVAS ENDÉMICAS NACIONALES DE INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO

